7 mm
½ corte

7,3 cm

100%
P.138C

20%
P. Cool Gray 9C

2,9 cm

Adicionar Proveedor / Lote

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA
Cra. 1 No. 58 - 41 Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito.
Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22. **REPÚBLICA DOMINICANA:** CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177. INDUSTRIA COLOMBIANA.
www.carvalcorp.com

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

Bovinos Equinos Porcinos

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO,
ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

10 mL

CARVAL
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

COMPOSICIÓN:
Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	***50 mg***
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES, DOSIS Y TIEMPO DE RETIRO:
Ver inserto adjunto.

RECOMENDACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

Especies de destino: Bovinos, Equinos y Porcinos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

2206F

100%
P. Cool Gray 9C

2024-05-28

CARVAL | Código Sap y Versión: **200124 - CR**

Referencia: Etiq. Flumegan 10 mL
Und. Neg: Agroganadería
Realizado por: Andrés Reyes
Aprobado por: Milena Gomez
Dimensión: 7,3 x 2,9 cm
Tintas: 4
Plataforma: MAC
Programa: Illustrator CC

100%
P.1255C

100%
P.3165C

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:56:30 -06'00'

Registro de Actualizaciones:

Versión	Referencia	Fecha
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se aplica negrilla a Manténgase fuera del alcance de los niños, se adiciona la versión.	15-05-21
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-10
C	Cambio en reg. Panama, adición de nombre proveedor y terminado a Uv parcial	17-06-13
D	Se modifica reg. de Ecuador y Panamá, se adiona % de color	17-11-29
E	Se modifica imagen del producto y recomendaciones, se ajusta el reg. de panamá y Dominicana.	19-07-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

100%
P.138C

20%
P. Cool Gray 9C

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO,
ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

30 mL

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA
Cra. 1 No. 58 - 41 Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito.
Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22. **REPÚBLICA DOMINICANA:** CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177. INDUSTRIA COLOMBIANA.
www.carvalcorp.com

CARVAL
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

COMPOSICIÓN:

Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	***50 mg***
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES , DOSIS Y TIEMPO DE RETIRO:

Ver inserto adjunto.

RECOMENDACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

Especies de destino: Bovinos, Equinos y Porcinos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

2206F

Adicionar Proveedor /Lote

100%
P. Cool
Gray 9C

2024-05-28

100%
P.1255C

100%
P.3165C

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:56:54 -06'00'

7 mm
½ corte

13,0 cm

100% P.138C

20% P. Cool Gray 9C

3,8 cm

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

Bovinos Equinos Porcinos

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

50 mL

COMPOSICIÓN:

Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	*50 mg*
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES, DOSIS Y TIEMPO DE RETIRO:

Ver inserto adjunto.

RECOMENDACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos y Porcinos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA Cra. 1 No. 58 - 41 Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito. Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD. **PANAMÁ:** Reg. MIDA No. RF-3926-22. **REPÚBLICA DOMINICANA:** CARVAL DOMINICANÁ S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177. INDUSTRIA COLOMBIANA. www.carvalcorp.com

Adición Nombre proveedor Lote

220F

100% P. Cool Gray 9C

CARVAL EXCELENCIA EN EL SERVICIO

CARVAL	Código Sap y Versión:	**200125 - CR**	
Referencia:	Etiq. Flumegan 50 mL	Realizado por:	Andrés Reyes
Und. Neg:	Agroganadería	Aprobado por:	Milena Gomez
Dimensión:	13,0 x 3,8 cm	Plataforma:	MAC
Tintas:	4	Programa:	Illustrator CC

100% P.1255C

100% P.3165C

Registro de Actualizaciones: Versión	Referencia	Fecha
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se aplica negrilla a Manténgase fuera del alcance de los niños, se adiciona la versión, ajuste en dimensiÓn de a ncho a 13 cm.	11-07-06
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-10
C	Cambio en reg de Panamá, adición nombre proveedor y terminado a Uv parcial	17-06-13
D	Se modifica reg. de Ecuador y Panamá, se adiona % de color	17-11-29
E	Se modifica imagen del producto y recomendaciones, se elimina el reg. de panamá y se ajusta registro de Dominicana	19-07-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

2024-05-28

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:57:12 -06'00'

CARVAL Código Sap y Versión: **211117- CR**

Referencia:	Etiq. Flumegan x 100 mL	Realizado por:	Andrés Reyes.
Und. Neg:	Agroganadería	Aprobado por:	Milena Gomez
Dimensión:	16,0 x 5,0 cm	Plataforma:	MAC
Tintas:	3	Programa:	Illustrator CC

Registro de Actualizaciones:

Versión	Referencia	Fecha
E	Creación de nueva presentación armonizado versión E	19-12-23
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

Largo 3,0 cm

Ancho 3,0 cm

Ancho 5,5 cm

CARVAL	Código Sap y Versión:	200195 - CR
Referencia: Pleg. Flumegan 10 mL Und. Neg: Agroganadería		Realizado por: Andrés Reyes Aprobado por: Milena Gomez
Dimensión: 3,0 x 3,0 x 5,5 cm Tintas: 4		Plataforma: MAC Programa: Illustrator CC

FLUMEGAN®
FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

2206F

Nombre o logo del proveedor
Lote/fecha
Cabida

TIEMPO DE RETIRO:

LOS ANIMALES (BOVINOS Y EQUINOS) TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 10 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 48 HORAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO. LOS PORCINOS TRATADOS DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 21 DÍAS DESPUES DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, mantènganse cerrado y protegido de la luz solar.
- **Mantènganse fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.
- No administrar a animales de menos de tres días de edad.
- No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al Flunixin.
- En ningún caso se debe exceder la dosis recomendada.
- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringuilla.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

Consulte al Médico Veterinario

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA Cra. 1 No. 58 - 41
Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito.
Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22.
REPÚBLICA DOMINICANA: CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177.
INDUSTRIA COLOMBIANA.
www.carvalcorp.com

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

Bovinos Equinos Porcinos

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

10 mL

CARVAL
INGENIUM IN EL BIENESTAR

COMPOSICIÓN:
Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	***50 mg***
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES:
En **bovinos**, **equinos** y **porcinos** como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
En **equinos** indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueleticos y del dolor visceral asociado a cólico.
En **bovinos** como coadyuvante en el tratamiento de la mastitis aguda, junto con la terapia antimicrobiana correspondiente.
En **porcinos** como coadyuvante en el tratamiento de Mastitis - Metritis - Agalactia (MMA).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Administrar cada 24 horas de acuerdo a la evolución clínica del animal, así:
Bovinos: 1,1 a 2,2 mg/kg de peso (1 a 2 mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Equinos: 1,1 mg/kg de peso (1mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Porcinos: 2,2 mg/kg de peso (2 mL/45 kg), vía intramuscular.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

100%
P. Cool Gray 9C

20%
P. Cool Gray 9C

100%
P.138C

2024-05-28

7 707321 670280

100%
P.1255C

100%
P.3165C

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:57:55 -06'00'

Registro de Actualizaciones:		
Versión	Referencia	Fecha
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se aplica negrilla a Mantènganse fuera del alcance de los nitros, se adiciona la versión y codigo de barras. Se ajusta reserva para codificado igual a la de Ivegan 10mL aprobada.	15-05-21 14-07-06
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-10
C	Cambio en reg. Panama, adicion de nombre proveedor y terminado a Liv parcial	17-06-13
D	Se modifica reg. de Ecuador y Panamá, se adiona % de color	17-11-29
E	Se modifica imagen del producto, dosis y modo de empleo y recomendaciones, se elimina el reg. de panama y se ajusta registro de Dominicana	19-07-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

Largo 3,0 cm

Ancho 3,0 cm

Ancho 5,5 cm

CARVAL	Código Sap y Versión:	200195 - CR
Referencia: Pleg. Flumegan 30 mL Und. Neg: Agroganadería		Realizado por: Andrés Reyes Aprobado por: Milena Gomez
Dimensión: 3,0 x 3,0 x 5,5 cm Tintas: 4		Plataforma: MAC Programa: Illustrator CC

Nombre o logo del proveedor
Lote/fecha
Cabida

FLUMEGAN®
FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

2206F

TIEMPO DE RETIRO:

LOS ANIMALES (BOVINOS Y EQUINOS) TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 10 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 48 HORAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO. LOS PORCINOS TRATADOS DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 21 DÍAS DESPUES DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.
- No administrar a animales de menos de tres días de edad.
- No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al Flunixin.
- En ningún caso se debe exceder la dosis recomendada.
- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringuilla.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

Consulte al Médico Veterinario

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA Cra. 1 No. 58 - 41
Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito.
Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22.
REPÚBLICA DOMINICANA: CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177.
INDUSTRIA COLOMBIANA.
www.carvalcorp.com

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

Bovinos Equinos Porcinos

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

30 mL

CARVAL
SOLUCIONES EN EL CAMPO

COMPOSICIÓN:
Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	***50 mg***
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES:
En **bovinos**, **equinos** y **porcinos** como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
En **equinos** indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueleticos y del dolor visceral asociado a cólico.
En **bovinos** como coadyuvante en el tratamiento de la mastitis aguda, junto con la terapia antimicrobiana correspondiente.
En **porcinos** como coadyuvante en el tratamiento de Mastitis - Metritis - Agalactia (MMA).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Administrar cada 24 horas de acuerdo a la evolución clínica del animal, así:
Bovinos: 1,1 a 2,2 mg/kg de peso (1 a 2 mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Equinos: 1,1 mg/kg de peso (1mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Porcinos: 2,2 mg/kg de peso (2 mL/45 kg), vía intramuscular.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

100% P. Cool Gray 9C

20% P. Cool Gray 9C

100% P.138C

100% P.1255C

100% P.3165C

2024-05-28

7 707321 670280

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:58:11 -06'00'

Registro de Actualizaciones:		
Versión	Referencia	Fecha
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se aplica negrilla a Manténgase fuera del alcance de los nitros, se adiciona la versión y codigo de barras. Se ajusta reserva para codificado igual a la de Ivegan 10mL aprobada.	15-05-21 14-07-06
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-10
C	Cambio en reg. Panama, adicion de nombre proveedor y terminado a Uv parcial	17-06-13
D	Se modifica reg. de Ecuador y Panamá, se adiona % de color	17-11-29
E	Se modifica imagen del producto, dosis y modo de empleo y recomendaciones, se elimina el reg. de panama y se ajusta registro de Dominicana	19-07-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

Largo 3,0 cm

Ancho 3,0 cm

Ancho 5,5 cm

CARVAL	Código Sap y Versión:	200196 - CR
Referencia: Pleg. Flumegan 50 mL Und. Neg: Agroganadería		Realizado por: Andrés Reyes Aprobado por: Milena Gomez
Dimensión: 3,0 x 3,0 x 5,5 cm Tintas: 4		Plataforma: MAC Programa: Illustrator CC

Nombre o logo del proveedor
Lote/fecha
Cabida

FLUMEGAN®
FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

2206F

TIEMPO DE RETIRO:

LOS ANIMALES (BOVINOS Y EQUINOS) TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 10 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 48 HORAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO. LOS PORCINOS TRATADOS DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 21 DÍAS DESPUES DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.
- No administrar a animales de menos de tres días de edad.
- No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al Flunixin.
- En ningún caso se debe exceder la dosis recomendada.
- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringuilla.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

Consulte al Médico Veterinario

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA Cra. 1 No. 58 - 41
Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir.Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito.
Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22.
REPÚBLICA DOMINICANA: CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177.
INDUSTRIA COLOMBIANA.
www.carvalcorp.com

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

Bovinos Equinos Porcinos

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

50 mL

CARVAL
SOLUCIONES EN EL CAMPO

COMPOSICIÓN:
Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	*50 mg*
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES:
En **bovinos**, **equinos** y **porcinos** como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
En **equinos** indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueleticos y del dolor visceral asociado a cólico.
En **bovinos** como coadyuvante en el tratamiento de la mastitis aguda, junto con la terapia antimicrobiana correspondiente.
En **porcinos** como coadyuvante en el tratamiento de Mastitis - Metritis - Agalactia (MMA).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Administrar cada 24 horas de acuerdo a la evolución clínica del animal, así:
Bovinos: 1,1 a 2,2 mg/kg de peso (1 a 2 mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Equinos: 1,1 mg/kg de peso (1mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Porcinos: 2,2 mg/kg de peso (2 mL/45 kg), vía intramuscular.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

100% P. Cool Gray 9C

20% P. Cool Gray 9C

100% P.138C

100% P.1255C

100% P.3165C

2024-05-28

7 707321 670280

Registro de Actualizaciones:		
Versión	Referencia	Fecha
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se aplica negrilla a Manténgase fuera del alcance de los nitros, se adiciona la versión y codigo de barras. Se ajusta reserva para codificado igual a la de Ivegan 10ml, aprobada.	15-05-21 14-07-06
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-10
C	Cambio en reg. Panama, adicion de nombre proveedor y terminado a Liv parcial	17-06-13
D	Se modifica reg. de Ecuador y Panamá, se adiona % de color	17-11-29
E	Se modifica imagen del producto, dosis y modo de empleo y recomendaciones, se elimina el reg. de panama y se ajusta registro de Dominicana	19-07-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:58:29 -06'00'

Largo 3,0 cm

Ancho 3,0 cm

Ancho 5,5 cm

CARVAL	Código Sap y Versión:	211118 - CR
Referencia: Pleg. Flumegan 100 mL Und. Neg: Agroganadería		Realizado por: Andrés Reyes Aprobado por: Milena Gomez
Dimensión: 3,0 x 3,0 x 5,5 cm Tintas: 4		Plataforma: MAC Programa: Illustrator CC

Nombre o logo del proveedor
Lote/fecha
Cabida

FLUMEGAN®
FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

2206F

TIEMPO DE RETIRO:

LOS ANIMALES (BOVINOS Y EQUINOS) TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 10 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 48 HORAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO. LOS PORCINOS TRATADOS DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 21 DÍAS DESPUES DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.
- No administrar a animales de menos de tres días de edad.
- No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al Flunixin.
- En ningún caso se debe exceder la dosis recomendada.
- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringuilla.
- Una vez abierto descartar el sobrante.

Consulte al Médico Veterinario

Lote No.
Fecha Fab.
Fecha Exp.

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA Cra. 1 No. 58 - 41
Cali - PBX: +57 (602) 6933365.
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito.
Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22.
REPÚBLICA DOMINICANA: CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177.
INDUSTRIA COLOMBIANA.
www.carvalcorp.com

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

Bovinos Equinos Porcinos

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

100 mL

CARVAL
SOLUCIONES EN EL SERVICIO

COMPOSICIÓN:
Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:

Flunixin (Meglumina)	***50 mg***
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES:
En **bovinos**, **equinos** y **porcinos** como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
En **equinos** indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueleticos y del dolor visceral asociado a cólico.
En **bovinos** como coadyuvante en el tratamiento de la mastitis aguda, junto con la terapia antimicrobiana correspondiente.
En **porcinos** como coadyuvante en el tratamiento de Mastitis - Metritis - Agalactia (MMA).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Administrar cada 24 horas de acuerdo a la evolución clínica del animal, así:
Bovinos: 1,1 a 2,2 mg/kg de peso (1 a 2 mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Equinos: 1,1 mg/kg de peso (1mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Porcinos: 2,2 mg/kg de peso (2 mL/45 kg), vía intramuscular.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER INSERTO ADJUNTO

100%
P. Cool Gray 9C

20%
P. Cool Gray 9C

100%
P.138C

2024-05-28

7 707321 670280

100%
P.1255C

100%
P.3165C

Registro de Actualizaciones:		
Versión	**Referencia**	**Fecha**
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se aplica negrilla a Manténgase fuera del alcance de los nitros, se adiciona la versión y codigo de barras. Se ajusta reserva para codificado igual a la de Ivegan 10mL aprobada.	15-05-21 14-07-06
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-10
C	Cambio en reg. Panama, adicion de nombre proveedor y terminado a Liv parcial	17-06-13
D	Se modifica reg. de Ecuador y Panamá, se adiona % de color	17-11-29
E	Se modifica imagen del producto, dosis y modo de empleo y recomendaciones, se elimina el reg. de panama y se ajusta registro de Dominicana	19-07-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:58:47 -06'00'

Ancho 19,0 cm

Plegado

Alto 12,3 cm

Elaborado por LABORATORIOS ERMA S.A.
Para CARVAL DE COLOMBIA Cali
COLOMBIA: Reg. ICA No. 4106-DB
Dir. Téc. Ana Cristina Chamorro D. Q. F.U.N.
Importado y distribuido por:
COSTA RICA: Reg. MAG No. MV-7783
ECUADOR: CARVALECUADOR S.A. Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas. Quito. Reg. No. 12C-5131-AGROCALIDAD.
PANAMÁ: Reg. MIDA No. RF-3926-22.
REPÚBLICA DOMINICANA: CARVAL DOMINICANA S.R.L. Reg. DIGEGA No. 4177 INDUSTRIA COLOMBIANA
www.carvalcorp.com

Para información adicional por favor dirigirse a:
CARVAL DE COLOMBIA
Mercadeo y Ventas: Cra. 1 No. 58 - 41
Tel: + 57 (602) 6933365 Santiago de Cali, Colombia.
Departamento Técnico: Calle 63 No. 19A - 35
Tel: + 57 (601) 3907183 Bogotá D.C, Colombia.

INDUSTRIA COLOMBIANA

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:59:05 -06'00'

CARVAL
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

2206F

FLUMEGAN®

FLUNIXIN (MEGLUMINA) 50 mg/mL

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

100%
P. Cool
Gray 9C

PRESENTACIONES
Frascos ampolla por 10, 30, 50 y 100 mL

COMPOSICIÓN
Cada mL de **FLUMEGAN®** contiene:
Flunixin (Meglumina)..... 50 mg
Excipientes c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES
En bovinos, equinos y porcinos como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
En equinos indicado para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueléticos y del dolor visceral asociado a cólico. En bovinos como coadyuvante en el tratamiento de la

Nombre o logo del proveedor

CARVAL	Código Sap y Versión: **200167 - CR**	
Referencia: Inserto Flumegan		Realizado por: Andrés Reyes.
Und. Neg: Agroganadería		Aprobado por: Milena Gomez
Dimensión: 19,0 x 12,3 cm		Plataforma: MAC
Tintas: 1		Programa: Illustrator CC

2024-05-28

Registro de Actualizaciones:		
Versión	**Referencia**	**Fecha**
F	Creación de documento	10-07-01
A	Se retira reg de Venezuela, se realiza ajuste en información de contacto, se adiciona la versión.	11-07-01
B	Se incluyen las razones sociales de Ecuador, Rep. Dominicana y Panamá	15-07-06
C	Cambio en reg. Panamá, adición de nombre proveedor	17-06-13
D	Se modifica reg. Ecuador y Panamá	17-11-29
E	Se modifica imagen de producto, se ajusta información debajo de la marca Flumegan, se modifica Dosis y modo de empleo, precauciones y datos de reg Dominicana	19-17-29
F	Se corrige el registro de Panamá	22-06-03
ICA	Se adiciona Dirección, teléfono y pag web de Carval, en recomendaciones se incluye la frase de disposición final de envases.	23-02-07

Ancho 19,0 cm

Plegado

Alto 12,3 cm

mastitis aguda, junto con la terapia antimicrobiana correspondiente. En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de Mastitis-Metritis-Agalactia (MMA).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Administrar cada 24 horas de acuerdo a la evolución clínica del animal, así:
Bovinos: 1,1 a 2,2 mg/kg de peso (1 a 2 mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Equinos: 1,1 mg/kg de peso (1mL/45 kg), vía intravenosa o intramuscular.
Porcinos: 2,2 mg/kg de peso (2 mL/45 kg), vía intramuscular.

En cólico equino, se puede repetir la dosis según la evolución clínica con el intervalo determinado por la gravedad del caso. La valoración correcta de un cólico determina la vida o muerte de un equino, puede ser necesaria una intervención quirúrgica si el dolor no cede.

En alteraciones osteo-musculares utilizar vía intravenosa. En caso de no presentar mejoría en dos dosis realizar nuevamente una valoración de la afección.

JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JAVIER FRANCISCO MOLINA ULLOA (FIRMA)
Fecha: 2024.06.19 14:59:21 -06'00'

2024-05-28

TIEMPO DE RETIRO

LOS ANIMALES (BOVINOS Y EQUINOS) TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 10 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 48 HORAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO. LOS PORCINOS TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 21 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

100% P. Cool Gray 9C

RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Almacenar por debajo de 30ºC, manténgase cerrado y protegido de la luz solar.
- **Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.
- No administrar a animales de menos de tres días de edad.
- No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al Flunixin.
- En ningún caso se debe exceder la dosis recomendada.
- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringuilla.
- Una vez abierto descartar el sobrante.