

Dirección de Medicamentos Veterinarios

Xilavet[®]
Inyectable

50 ml

Uso Veterinario

Sedante analgésico

Indicaciones: Sedante analgésico para intervenciones quirúrgicas en pequeños animales. Maniobras exploratorias o semiológicas.

Administración y dosis: caninos y felinos.
Se produce entre 5 minutos por I/V o 15 minutos por I/M. Dejar el animal en tranquilidad hasta que se produzcan los síntomas. En inyecciones subcutáneas o en tejido graso se retrasa la absorción de manera que por su rápida eliminación no se produce el efecto deseado.

En caninos I/V 0,05 a 0,1 mg./Kg. I/M 1 a 3 mg./Kg.
En felinos I/V 0,5 a 1 mg./Kg. I/M 1 a 3 mg./Kg.

PRECAUCIONES: No utilizar en el último mes de gestación bajo riesgo de provocar aborto. En perros y gatos que presenten oclusión esofágica, torsiones estomacales, hernias y similares por el peligro del efecto de emesis.

Lea el inserto antes de utilizar el producto.

CONTRAINDICACIONES: No administrar en animales que recibieron epinefrina. Ver prospecto adjunto.

ALMACENAMIENTO: No almacenar a temperaturas superiores a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

INDICATIONS: Analgesic and sedative for surgical interventions in animals. Exploratory or semiological maneuvers.

DOSSAGE: It produces effect between 5 minutes I/V and 15 minutes I/M. Leave the animal calm until it produces effect.

CAUTION: Do not apply subcutaneously, in last month of pregnancy and in animals with esophageal occlusion, stomach torsion, hernias, or similar.

STORE: Do not store above 30°C. Keep out the reach of children

Xilavet[®]
Inyectable

Unimedical[®]
Calidad con Seguridad

50 ml

MEDICAMENTO CONTROLADO
CONTROLLED DRUG
VENTA BAJO RECETA MÉDICA VETERINARIA
SALE UNDER PRESCRIPTION

Cada ml de solución contiene 20 mg de Xilacina Clorhidrato.

Each ml of solution contains 20 mg of Xylazine Hydrochloride.

للاستخدام البيطري فقط

Descartar una vez abierto el frasco y transcurrido los 28 días. Eliminar el envase en el centro de acopio más cercano.

Reg. MGAP A 1763 Reg. INSAI2041P033N0524423

Reg. SENASA MV-7819 Reg.

Reg. MAGA

Partida / Serie:

Salón:

Fecha de Fabo:

Fabrication date:

Fecha de Vto:

Expiration date:

Fabricado por Laboratorio Ripoll para UNIMEDICAL Div. Veterinaria
Industria Uruguaya
Paysandu 986 - CP. 11100 - Mdeo. Uruguay
Tel.: +598 29000090
Dir.Téc. Dra. Mercedes Etcheverry
www.laboratoriounimedical.com

Veterinary Use Only

Analgesic sedative

Xilavet[®]
Inyectable

Unimedical[®]
Calidad con Seguridad

50 ml



7938 UR

Negro
Pantone nº 192 C

للإستخدام البيطري فقط		FABRICADO POR RIPOLL VET SA PARA UNIMEDICAL				Uso Veterinario	
Mantener al abrigo de luz, calor y humedad		50 ml.		Sedante anestésico		No almacenar a temperaturas superiores a 30°C	
Lote: F. Fab.: F. Vto.:		Reg. J.MIDA MV-2526 Reg. SENASA MV-7819		 Unimedical Calidad con Seguridad		ADMINISTRACION Y DOSIS: En caninos: IV: 0,05 a 0,1 mg/Kg I/M: 1 a 3 mg/Kg En felinos: IV: 0,5 a 1 mg/Kg I/M: 1 a 3 mg/Kg Los efectos se producen entre 5 minutos por IV y 15 minutos por I/M. Dejar el animal en tranquilidad hasta que se produzcan los síntomas. Dosis orientativas.	
INDICACIONES / Usos: Sedante anestésico para intervenciones quirúrgicas en pequeños animales. Maniobras exploratorias o semiológicas.		Reg. J.MIDA MV-2526 Reg. SENASA MV-7819 Reg. MCGAP 1763 UNIMEDICAL Div. Ve terinaria Industria Uruguaya Unimedical del Uruguay Payson 886-CF-11 00 - Mdeo. Uruguay Tels: (+598) 2900080 Ext. laboratorio N° 43 Dir. Tlc. Dra. Mercedes www.laboratoriounimedical.com					
INDICATIONS: Anesthetic sedative for surgical interventions in pets, exploratory maneuvers or semiological. Do not store above 30°C.		Reg. J.MIDA MV-2526 Reg. SENASA MV-7819 Reg. MCGAP 1763 UNIMEDICAL Div. Ve terinaria Industria Uruguaya Unimedical del Uruguay Payson 886-CF-11 00 - Mdeo. Uruguay Tels: (+598) 2900080 Ext. laboratorio N° 43 Dir. Tlc. Dra. Mercedes www.laboratoriounimedical.com		Fórmula: Cada ml contiene 20 mg de Xilacina clorhidrato Every ml contains 20 mg of Xilazine chlorhydrate		PRECAUCIONES-CONTRAINDICACIONES No utilizar en el último mes de gestación bajo riesgo de provocar aborto. En perros y gatos que presenten oclusión esofágica, torsiones estomacales, hernias y similares por el peligro del efecto de emesis. Do not use in the last month of pregnancy under risk of cause abortion. In dogs and cats that present esophageal occlusion, stomach torsions, hernias and the like because of the danger of emesis effect.	
MEDICAMENTO CONTROLADO Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Eliminar el envase en el centro de acopio más cercano.		Reg. MCGAP 1763 UNIMEDICAL Div. Ve terinaria Industria Uruguaya Unimedical del Uruguay Payson 886-CF-11 00 - Mdeo. Uruguay Tels: (+598) 2900080 Ext. laboratorio N° 43 Dir. Tlc. Dra. Mercedes www.laboratoriounimedical.com		50 ml			
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA							

Servicio
Nacional de
Salud Animal **APROBADO**
MAG · COSTA RICA

**Dirección de Medicamentos
Veterinarios**

USO EN MEDICINA VETERINARIA

Xilavet
Inyectable
Sedante / Analgésico

Uso en Caninos y Felinos
Sedante, analgésico y miorelajante haciendo posible maniobras semiológicas.
Anestésico para intervenciones quirúrgicas. Maniobras exploratorias o semiológicas

FÓRMULA:

Cada ml de solución contiene 20 mg de Xilacina Clorhidrato

DOSIFICACIÓN:

Caninos I/V 0.05/0.1 mg/kg I/M 1-3 mg/kg

Felinos I/V 0.5/1 mg/kg I/M 1-3 mg/kg

A criterio del medico veterinario

Dosis orientativa según la vía y la duración elegida como asimismo la asociación con otras drogas.

Uso profesional exclusivo.

RECOMENDACIONES:

Las dosis y advertencias sugeridas en todos los casos quedan a consideración del médico veterinario actuante.

De ninguna forma y bajo ningún concepto se debe transvasar el producto o exponer su contenido al medio ambiente; maniobra que pone en riesgo la correcta conservación del mismo.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en animales que recibieron epinefrina. Extrema cautela en animales con disfunción cardiaca preexistente, hipotensión o choque, disfunción respiratoria insuficiencia renal o hepática, bradicardia.

No usar en perros y gatos que presenten oclusión esofágico, torsiones estomacales, hernias o similares por el peligro del efecto de emesis.

PRECAUCIONES:

No utilizar en el último tercio de gestación.

PRESENTACIONES: Frasco vidrio 50 ml

ALMACENAMIENTO: No almacenar a temperaturas superiores de 30°C, almacenar al abrigo de la luz solar directa, conservando en lugar seco e higiénico.
Mantener alejado de los niños y animales domésticos.
Eliminar el envase en el centro de acopio más cercano.

MEDICAMENTO CONTROLADO.
Venta bajo receta médico veterinaria.

Reg. MGAP N° A 1763

Reg. MV-2526

Reg. SENASA MV-7819

Reg. MAGA

Industria Uruguaya
Fabricado por Ripoll Vet SA para
UNIMEDICAL del URUGUAY LTDA.
División Veterinaria.
Dir. Téc. Dra. Mercedes Etcheverry
Paysandu 986 - Montevideo - Uruguay
Tels.: 598 29000090
info@laboratoriounimedical.com

Servicio
Nacional de
Salud Animal
MAG • COSTA RICA

APROBADO

**Dirección de Medicamentos
Veterinarios**