

no se observa mejoría alguna, debe reconsiderarse el diagnóstico. En cada caso debe establecerse el consumo medio de agua de los animales. A modo de orientación puede tomarse como consumo estándar 150 ml de agua por cada 1000 gramos de p.v./día, en cuyo caso la dosis administrada corresponderá a 13-25 gotas de TABERNIL ANTIASMÁTICO por cada 100 ml de agua/día. Por razones higiénicas se recomienda cambiar diariamente el agua de bebida, esté medicada o no. Una vez abierto el medicamento puede utilizarse durante 28 días. El agua medicada debe utilizarse inmediatamente.

RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: En caso de existir enfermedades infecciosas o parasitarias debe instaurarse una terapia específica. El consumo diario de agua depende de la temperatura ambiental y de otros factores como el estado fisiológico de las aves por lo que la cantidad real de agua consumida puede variar considerablemente.

TIEMPO DE ESPERA:

No procede al utilizarse en animales no destinados al consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACION:

Mantener bien cerrado por debajo de 30°C.

ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES): Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los animales:

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a alguno de los componentes. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara. No fumar, comer o beber mientras se manipule el producto. Si aparecen síntomas tras la exposición como agitación, excitación o sintomatología gastrointestinal, consultar a un médico. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Con el acetilsalicílico, la dexametasona favorece la eliminación de salicilatos. Con otras metilxantinas pueden producirse efectos adversos por adición. Las fluorquinolonas y macrólidos interfieren en el metabolismo hepático de la teofilina.

Sobredosificación (síntomas, procedimientos de emergencia, antidotos):

La administración de dosis muy elevadas y durante períodos prolongados de tiempo podría dar lugar a hipopotasemia, agitación, arritmias y convulsiones.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Presentaciones: Frasco conteniendo 20 ml.

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al titular de la autorización de comercialización.

Uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Reg. MAG ES6-12-2-2819



Divisa-Formavic, S.A. (DFV)
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 GURB-VIC
(Barcelona) ESPAÑA