USO VETERINARIO
Industria Argentina

Antiemético
Gastrocinético

PILERAN®

Metoclopramida clorhidrato 0,5%
Solución inyectable SC, IM, EV
Para Perros y Gatos

Pileran® es un potente antiemético de acción central y periférica con efecto gastrocinético a nivel gastropiloroduodenoyeyunal.

Composición:
Cada 100 mL contiene:
Metoclopramida clorhidrato ..... 0,5 g
Excipientes csp ..... 100 mL

Indicaciones:
Tratamiento del vómito de diversas etiologías, esofagitis por reflujo, náuseas y trastornos de la motilidad gástrica. Preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo.

Advertencias y precauciones especiales de uso:
En la administración por infusión continua se sugiere proteger de la luz la solución parenteral en la cual se diluye la Metoclopramida. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática y renal y en pacientes epilépticos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICO VETERINARIA.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 | 4654-6648 (Buenos Aires, Argentina)

Contraindicaciones:
No usar en cuadros gastrointestinales asociados a la presencia de cuerpos extraños lacerantes, obstrucción mecánica o perforaciones digestivas. No usar en pacientes con hipersensibilidad al principio activo. No usar en estados tempranos de preñez. No usar durante la lactancia.

Dosis, vías de administración y modo de empleo:
0,5 mg/kg de peso vivo/8 horas, equivalente a 1 mL de Pileran®/10 kg de peso vivo/8 horas.
Por infusión continua: 1-2 mg/kg de peso vivo/día, equivalente a 1 mL de Pileran®/2,5-5 kg de peso vivo/día.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15-30°C. Proteger de la luz.
Una vez abierto utilice en 28 días, posteriormente descarte cualquier sobrante.

Efectos no deseados o reacciones adversas:
Infrecuentemente se presentan afectos asociados con el bloqueo de receptores dopaminérgicos, caracterizados por cambios conductuales, agitación, desorientación, alucinaciones, mareos, efecto sedante y constipación en caso de tratamientos prolongados.

Interacción con otros productos:
No utilizar en forma concomitante con anticolinérgicos (Atropina) ya que puede bloquear el efecto sobre la motilidad gastrointestinal; ni con tranquilizantes fenotiacínicos (Acepromacina) ya que potencia el efecto sobre el SNC.

Precauciones especiales para el operador:
En caso de inyección accidental consultar al médico.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:
Desechar los restos del producto dentro de su envase original junto con los residuos domésticos.
No reutilizar los envases.

Presentación: Frasco-ampolla x 50 mL.

SENASA Cert. N°: 76.308
Estab. Elab. N°: 979

Director Técnico: Juan Herrou
Veterinario - M.N. N° 8215

Bolivia Reg. SENASAG PUV-F N° 000313/03 - Importado por: GUC SRL Av. Cap. Arrien N° 140, Zona Parque Urbano, Santa Cruz, Bolivia, Tel: 591-3-477310
Costa Rica Reg. M.A.G. N° AR3-48-13-643 Tel. Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-10-28
Ecuador Reg. N° 5C-5217-AGROCALIDAD Importado y distribuido por: PRODUCTOS VETERINARIOS ECUATORIANOS MEVECSA S.A. Av. Diego de Almagro N° 29-54 y La Pradera Piso 1, Teléfono (00593) 2323-72122, Quito, Ecuador
Reg. **El Salvador** VE2008113838 - Centro Toxicológico Nacio Tel. 2231-9200, E> Distribuido por: SA Blvd. Del Ejército I (503) 2205-2700
Reg. **Guatemala** M
Nicaragua Reg. N Nicaragüense S.A. Norte frente a talle Nicaragua, Tel. 22-
Honduras Reg. N°
Panamá Reg. N° F
Paraguay Reg. SE Importado y Distrit BUONGERMINI S

Elabc
HOLLIDAY
Int. Neyer 924 (B1643GAT) Beccar - Bueno
e-mail: info@

80-1017 U

PILERAN INYECTABLE PROSPECTO 80-1017 U (FRENTE Y DORSO)