

**COMPOSICIÓN:**  
Cada 100 mL de producto contiene:  
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g  
Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**  
Intramuscular  
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:**  
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
Agitar bien antes de usar.  
Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**  
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
Bovinos: Leche: no requiere.  
Carne: 15 días.  
Porcinos: Carne: 3 días.

**INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE**

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.  
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.  
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701  
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por:  
Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.  
San José, Costa Rica.  
Teléfono: 506-8955550

**ANTIBIÓTICOS**

**CLINEXIN 5%**  
Ceftiofur 5%  
Suspensión Inyectable  
REG.SENASA: MV-3212

USO VETERINARIO

**20 mL**

N° de Serie  
F. Elab.:  
F. Venc.:



# TAMAÑO ORIGINAL

**COMPOSICIÓN:**  
Cada 100 mL de producto contiene:  
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g  
Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**  
Intramuscular  
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:**  
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
Agitar bien antes de usar.  
Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**  
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
Bovinos: Leche: no requiere.  
Carne: 15 días.  
Porcinos: Carne: 3 días.

**INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE**

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.  
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.  
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701  
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por:  
Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.  
San José, Costa Rica.  
Teléfono: 506-8955550

**ANTIBIÓTICOS**

**CLINEXIN 5%**  
Ceftiofur 5%  
Suspensión Inyectable  
REG.SENASA: MV-3212

USO VETERINARIO

**20 mL**

N° de Serie  
F. Elab.:  
F. Venc.:



REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 4	 375 C CMYK		90x35 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios		Código de producto	Versión
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:		ETIQU03596	V.5 COSTA RICA
<b>CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO</b>						
<b>APROBACIÓN DIGITAL</b>						

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de producto contiene:  
 Cefotiofur (como clorhidrato) 5 g  
 Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.  
 Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
 Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO**  
 Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
 Agitar bien antes de usar.  
 Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
 Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
 Bovinos: Leche: no requiere.  
 Carne: 15 días.  
 Porcinos: Carne: 3 días.

**VENTA bajo receta Médico Veterinaria.**

**Información Completa se encuentra en el estuche**

**Importado y Distribuido por:**  
 Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.  
 San José, Costa Rica.  
 Teléfono: 506-8895550

**ANTIBIÓTICOS**

**CLINEXIN 5%**  
 Cefotiofur 5%  
 Suspensión Inyectable

**REG.SENASA: MV-3212**

**USO VETERINARIO**

**50 mL**

Nº de Serie:  
 Fecha elab.:  
 Fecha venc.:

# TAMAÑO ORIGINAL

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de producto contiene:  
 Cefotiofur (como clorhidrato) 5 g  
 Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.  
 Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
 Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO**  
 Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
 Agitar bien antes de usar.  
 Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
 Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
 Bovinos: Leche: no requiere.  
 Carne: 15 días.  
 Porcinos: Carne: 3 días.

**VENTA bajo receta Médico Veterinaria.**

**Información Completa se encuentra en el estuche**

**Importado y Distribuido por:**  
 Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.  
 San José, Costa Rica.  
 Teléfono: 506-8895550

**ANTIBIÓTICOS**

**CLINEXIN 5%**  
 Cefotiofur 5%  
 Suspensión Inyectable

**REG.SENASA: MV-3212**

**USO VETERINARIO**

**50 mL**

Nº de Serie:  
 Fecha elab.:  
 Fecha venc.:

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 4			120x35 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
<b>Elaborado por Diseñador</b>	<b>Aprobado por Gerencia Comercial</b>	<b>Revisado por Regulatorio</b>	<b>Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios</b>		<b>Código de producto</b>	<b>Versión</b>
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:		ETIQU03597	<b>V.5</b> COSTA RICA
<b>CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO</b>						
<b>APROBACIÓN DIGITAL</b>						

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de producto contiene:  
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g  
Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.  
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:**  
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
Agitar bien antes de usar.  
Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
Bovinos: Leche: no requiere.  
Carne: 15 días.  
Porcinos: Carne: 3 días.

**Venta bajo receta Médico Veterinaria.**

**Información Completa se encuentra en el estuche**

**ANTIBIÓTICOS**

# CLINEXIN 5%

## Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable

REG.SENASA: MV-3212

USO VETERINARIO

### 100 mL

Nº de Serie:  
Fecha elab.:  
Fecha venc.:




# TAMAÑO ORIGINAL

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de producto contiene:  
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g  
Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.  
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:**  
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
Agitar bien antes de usar.  
Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
Bovinos: Leche: no requiere.  
Carne: 15 días.  
Porcinos: Carne: 3 días.

**Venta bajo receta Médico Veterinaria.**

**Información Completa se encuentra en el estuche**

**ANTIBIÓTICOS**

# CLINEXIN 5%

## Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable

REG.SENASA: MV-3212

USO VETERINARIO

### 100 mL

Nº de Serie:  
Fecha elab.:  
Fecha venc.:




REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 4	 375 C CMYK		140x45 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios	Código de producto	Versión	
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:	ETIQU03112	V.5 COSTA RICA	
<b>CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO</b>						
<b>APROBACIÓN DIGITAL</b>						

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de producto contiene:  
 Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g  
 Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.  
 Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
 Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:**  
 Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
 Agitar bien antes de usar.  
 Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
 Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
**Bovinos:** Leche: no requiere.  
 Carne: 15 días.  
**Porcinos:** Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.  
 Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.  
 Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701  
 e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por:  
 Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.  
 San José, Costa Rica.  
 Teléfono: 506-88955550

ETIQU03598 170x65MM 180722CRR4V5

ANTIBIÓTICOS

# CLINEXIN 5%

## Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable

REG.SENASA: MV-3212

USO VETERINARIO

### 250 mL

Nº de Serie:  
Fecha elab.:  
Fecha venc.:



## TAMAÑO ORIGINAL

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de producto contiene:  
 Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g  
 Excipientes c.s.p. 100 mL

**ESPECIES DE DESTINO:** Bovinos y Porcinos.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.  
 Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.  
 Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:**  
 Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.  
 Agitar bien antes de usar.  
 Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.  
 Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

**PERIODO DE RESGUARDO:**  
**Bovinos:** Leche: no requiere.  
 Carne: 15 días.  
**Porcinos:** Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.  
 Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.  
 Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701  
 e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por:  
 Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.  
 San José, Costa Rica.  
 Teléfono: 506-88955550

ETIQU03598 170x65MM 180722CRR4V5

ANTIBIÓTICOS

# CLINEXIN 5%

## Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable

REG.SENASA: MV-3212

USO VETERINARIO

### 250 mL

Nº de Serie:  
Fecha elab.:  
Fecha venc.:



REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 4	 375 C CMYK		170x65 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
<b>Elaborado por Diseñador</b>	<b>Aprobado por Gerencia Comercial</b>	<b>Revisado por Regulatorio</b>	<b>Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios</b>		<b>Código de producto</b>	<b>Versión</b>
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:		ETIQU03598	V.5 COSTA RICA
<b>CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO</b>						
<b>APROBACIÓN DIGITAL</b>						