

| REVISIÓN SAG | PANTONE | EAN 13 | MEDIDA | s | SENTIDO SALIDA | GAP x ETIQ. | | SUSTRATO | |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|------------|--|-------------------|
| REV. 4 | ■ 375 C ■ CMYK | N/A | 35x35x72 | 2 mm | N/A | N/A | | Cartulina estucada 350g. Rev. blanco. Barniz uv. | |
| Elaborado por Diseñador | Aprobado por Gerencia Comercial | Revisado po Regulatorio | | Jefe A | Aprobado por Asuntos Regula | Código os de producto | | Versión | |
| Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 Firma : | Nombre: Fecha:/_/_ Firma: | Nombre: Francisca Fecha:// Firma: | | | bre: Ingrid Fuentes na:// a: | | ESTUC03309 | | V.5 COSTA RICA |

APROBACIÓN DIGITAL

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO





OMPOSICIÓN: ada 100 mL de producto contien efficifur (como clorhidrato) xcipientes c.s.p.

ESPECIES DE DESTINO:

INDICACIONES DE USO: En el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gran negativos (induyendo cepas productoras de betalactamasas), en Bovinos y Porcinos.

Bovinos: Tratamiento de Enfermedad Respiratoria Bovina, (ERB) incluyendo ganado lechero de producción (fiebre del embarque, neumonía).

Porcinos: Tratamiento y control de la Enfermedad respiratoria Porcina (neumonía bacteriana o pleuroneumonía de los Porcinos).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo po 3-5 días.



Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable





ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos. Agitar bien antes de usar. Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar. Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un nes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.


USO VETERINARIO

REG.SENASA: MV-3212





Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable





Fecha elab. Fecha venc.



O NOMBRE DE LA IMPRENTA

SENTIDO REVISIÓN SAG PANTONE EAN 13 MEDIDAS GAP x ETIQ. **SUSTRATO** SALIDA Cartulina estucada 375 C REV. 4 350g. Rev. blanco. N/A N/A N/A 43x43x82 mm CMYK Barniz uv. Aprobado por

Revisado por Regulatorio Código de producto Elaborado por Diseñador Aprobado por Versión Gerencia Comercial Jefe Asuntos Regulatorios Nombre: Daniel Zuñiga Nombre: Ingrid Fuentes Nombre: Nombre: Francisca Castillo V.5 Fecha: 18-07-2022 Fecha: ___/__/_ Fecha: Fecha: ___/__/_ ESTUC03310 Firma: Firma : Firma: Firma: COSTA RICA

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO

APROBACIÓN DIGITAL





COMPOSICIÓN:

ada 100 mL de producto contiene eftiofur (como clorhidrato) xcipientes c.s.p. 5 g 100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

INDICACIONES DE USO:

En el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (incluyendo cepas productoras de betalactamasas), en Bovinos y Porcinos.


Bovinos: Tratamiento de Enfermedad Respiratoria Bovina, (ERB) incluyendo ganado lechero de producción (fiebre del embarque, neumonía).

Porcinos: Tratamiento y control de la Enfermedad respiratoria Porcina (neumonia bacteriana o pleuroneumonía de los Porcinos).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3-5 días. Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3-5 días.



Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable





ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:

Bovinos: Leche: no requiere. Carne: 15 días. Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

REG.SENASA: MV-3212








Nº de Serie: Fecha elab.: Fecha venc.:

ESTUC03043

COSTA RICA



INSERTE AQUI LOGO O NOMBRE DE LA IMPRENTA

Firma



Firma:

| REVISIÓN SAG | PANTONE | EAN 13 | MEDIDA | AS | SENTIDO SALIDA | GAP x ETIQ. | | SUSTRATO | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|----------|---|------------------------|-------------|-----------------------|----------|--|--|
| REV. 4 | ■ 375 C ■ CMYK | N/A | 51x51x10 | 05 mm | N/A | | N/A | | Cartulina estucada 350g. Rev. blanco. Barniz uv. | |
| Elaborado por Diseñador | Aprobado por Gerencia Comercial | Revisado po Regulatorio | | Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios | | | Código de producto | | Versión | |
| Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 | Nombre: Fecha:// | Nombre: Francisca Fecha:// | | | re: Ingrid Fue ::// | | ESTUC | 03043 | V.5 | |

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO

Firma:

APROBACIÓN DIGITAL

Firma:



%G NIXANITO

Suspensión Inyectable

Ceftiofur 5%

EXIN 5%



COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene: Ceftiofur (como clorhidrato) . 5 g 100 mL Excipientes c.s.p.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos y Porcinos.

INDICACIONES DE USO:

En el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (incluyendo cepas productoras de betalactamasas), en Bovinos y Porcinos.

Bovinos: Tratamiento de Enfermedad Respiratoria Bovina, (ERB) incluyendo ganado lechero de producción (fiebre del embarque,

Porcinos: Tratamiento y control de la Enfermedad respiratoria Porcina (neumonía bacteriana o pleuroneumonía de los Porcinos).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3-5 días. Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por

> INSERTE AQUI LOTE DE PRODUCCIÓN

INSERTE AQUI LOGO O NOMBRE DE LA IMPRENTA



ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES

ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.

Agitar bien antes de usar. Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de
un mes y mantener bajo las mismas
condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO: Bovinos: Leche: no requiere. Carne: 15 días. Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO


REG.SENASA: MV-3212

Fabricado en Chile por L Av. Los Cerrillos 60 Teléfono: (56-2) 2583 77 e-mail: centrovet@centrov



GLINEXIN 5%

Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable



ESTUC03311

COSTA RICA







Firma:

| REVISIÓN SAG | PANTONE | EAN 13 | MEDIDA | AS | SENTIDO SALIDA | GAP x ETIQ. | | SUSTRATO | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------|---|--------------------------|-----------------|-------|----------|-------------------------------------|
| REV. 4 | ■ 375 C ■ CMYK | N/A | 68x68x14 | 40 mm | N/A | N | | | ina estucada Rev. blanco. uv. |
| Elaborado por Diseñador | Aprobado por Gerencia Comercial | Revisado po Regulatorio | | Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios | | Códi de prod | | Versión | |
| Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 18-07-2022 | Nombre: Fecha: / / | Nombre: Francisca Fecha: / / | Castillo | Nomb Fecha | re: Ingrid Fue a: / / | ntes | ESTUC | 12211 | V.5 |

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO

Firma :

Firma:

APROBACIÓN DIGITAL

Firma: