



Solución Inyectable
REG. SAGARPA: Q-0666-038
Clindafur®
LABORATORIO
InnoPharma®

Clindafur®
Clindamicina
REGISTRO SAGARPA Q-0666-038
Solución Inyectable
Antibiótico



Contenido Neto:
Caja con frasco con 25 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Fosfato de clindamicina equivalente
a Clindamicina 100.0 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:
Clindafur® esta indicado para el tratamiento de infecciones pulmonares, dentales, osteoartriticas, de la piel, de tejidos blandos, de la próstata y en casos de toxoplasmosis. La Clindamicina es más eficaz en el tratamiento de infecciones causadas por anaerobios.

DOSIS:
Caninos y Felinos domésticos: 5 a 10 mg/ kg de peso corporal.
En dosis baja: 1 mL por cada 20 kg
En dosis alta: 1 mL por cada 10 kg
Cada 12 hrs. Durante 5 a 7 días. La duración del tratamiento será de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular

ADVERTENCIAS:
Este producto es seguro a las dosis recomendadas, sin embargo se pueden presentar en raras ocasiones los siguiente efectos, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y tenesmos, aumento reversible de las transaminasas hepáticas, trombocitopenia y granulocitopenia.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Clindafur®
Clindamicina
REGISTRO SAGARPA Q-0666-038
Solución Inyectable
Antibiótico



Contenido Neto:
Caja con frasco con 25 mL

Léase instructivo anexo

ALMACENAMIENTO:
Consérvese en un lugar seco y fresco a no más de 30°C.
Manténgase bien cerrado.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

"Este producto puede causar resistencia a los antimicrobianos"
"Una vez abierto el producto, use por completo de inmediato, descarte cualquier sobrante no usado"

Hecho en México por:
INNOPHARMA, S. DE R. L. DE C.V.
Av. San Pablo No 79-C
Col. Santa Bárbara, CP 02230
Del. Azcapotzalco, Ciudad de México.
Tel: (01 55) 2626 9100 Ext.512-522
ventas@innopharma.com.mx
www.innopharma.com.mx



Costa Rica: MV-7188

Lote No.: / Fecha de Caducidad: /
Fecha de Elaboración (mes/año)

32542-A002

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Fosfato de clindamicina equivalente
a Clindamicina.....100.0 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Clindafur® esta indicado para el tratamiento de infecciones pulmonares, dentales, osteoartríticas, de la piel, de tejidos blandos, de la próstata y en casos de toxoplasmosis. La Clindamicina es más eficaz en el tratamiento de infecciones causadas por anaerobios.

DOSIS:

Caninos y Felinos domésticos: 5 a 10 mg/ kg de peso corporal cada 12 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular

Léase instructivo anexo

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar seco y fresco a no más de 30°C.



Clindafur®

REG. SAGARPA: Q-0666-038

Clindamicina
Solución inyectable
Antibiótico

Contenido Neto:
Frasco con 25 mL

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA**

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA
VETERINARIA.**

"Este producto puede causar resistencia a los antimicrobianos"
"Una vez abierto el producto, use por completo de inmediato,
descarte cualquier sobrante no usado"

HECHO EN MÉXICO POR:

INNOPHARMA, S. DE R. L. DE C.V.

Av. San Pablo No 79-C,
Col. Santa Bárbara. Del Azcapotzalco, CP.02230
Ciudad de México,

Tel: (01 55) 2626 9100 Ext. 512-522

ventas@innopharma.com.mx

www.innopharma.com.mx

30226-A003

Lote No.: / Fecha de Caducidad: /
Fecha de Elaboración (mes/año)

**Área de reserva
10mmx 22mm**

COSTA RICA: MV-7188

CLINDAFUR®

Registro SAGARPA Q-0666-038
Clindamicina
Solución inyectable / Antibiótico

INSTRUCTIVO



FÓRMULA:

Cada mL contienen:
Fosfato de Clindamicina equivalente a
Clindamicina.....100 mg
Vehículo c.b.p..... 1mL

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Clindafur® es un antibacteriano de amplio espectro, incluye bacterias Gram negativas, Gram positivas, anaerobias y protozoarios como: *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Bacteroides spp*, *Actinomyces spp*, *Fusubacterium spp*, *Toxoplasma gondii*, *Neospora caninum*, *Chlamydia sp* y *Mycoplasma sp*. **Clindafur®** está indicado para el tratamiento de infecciones pulmonares, dentales, osteoartíticas, de la piel, de tejidos blandos, de la próstata y en casos de toxoplasmosis. La Clindamicina es más eficaz en el tratamiento de infecciones causadas por anaerobios.

USO EN:

Caninos y Felinos domésticos.

DOSIS:

La dosis recomendada de Clindamicina es de 5 a 10 mg/kg de peso corporal o 1mL de **Clindafur®** por cada 10 o 20 kg de peso corporal. La dosis total puede dividirse en dos aplicaciones con un intervalo de administración entre cada una de 12 horas. La duración del tratamiento es de 5 o 7 días de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico Veterinario.

Caninos domésticos

kg de peso corporal	mL
1 a 5	0.5
5 a 10	0.5 – 1
10 a 20	1 - 2
20 a 30	2 – 3
30 a 40	3 – 4
40 a 50	4 – 5
50 a 60	5 – 6
60 a 70	6 - 7

Felinos domésticos

kg de peso corporal	mL
1 a 3	0.3
3 a 5	0.5
5 a 6	0.6

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, utilice jeringa y aguja estériles.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No administrar concomitante con otros antibióticos como Cloranfenicol o Macrólidos.

CONTRAINDICACIONES:

La Clindamicina deberá ser empleada con precaución en gatos con toxoplasmosis pulmonar. Ya que en algunas investigaciones se ha indicado la muerte de varios gatos con este tipo de toxoplasmosis, después de la administración de Clindamicina vía parenteral.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su aplicación en animales sensibles a la fórmula, con enfermedad hepática y/o renal. EL uso durante la gestación no ha mostrado efectos teratogénicos; sin embargo durante la lactancia los cachorros pueden presentar diarrea. En terapias prolongadas se recomienda el uso de probióticos para mantener el equilibrio de la flora intestinal normal. No administrar en animales con hipersensibilidad a la Lincomicina y Clindamicina.

RESTRICCIONES:

Se pueden presentar dolor en el sitio de aplicación. No usar en cachorros o gatitos recién nacidos. No administrar a gatos menores de 2 kg de peso.

Se pueden presentar algunos efectos adversos gastrointestinales con el uso oral e intramuscular que consisten en náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y tenesmo, aumento reversible de las transaminasas hepáticas, trombocitopenia y granulocitopenia. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco a no más de 30°C. Manténgase bien cerrado.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE DE RECETA MÉDICA
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.**

**"Este producto puede causar resistencia a los antimicrobianos"
"Una vez abierto el producto, use por completo de inmediato,
descarte cualquier sobrante no usado"**

Hecho en México por:

INNOPHARMA S. DE R.L. DE C.V.
Av. San Pablo No. 79-C,
Col. Santa Bárbara.
Azcapotzalco, CP 02230, Ciudad de México.
Tel. (01 55) 26 26 91 00, Ext. 512-522
ia_ventas@loeffler.com.mx
www.loefflervet.com.mx



35219-A002