

APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JOSE PABLO SOLANO
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.10.28
09:20:23 -06'00'

GARRAPATICIDA E INSECTICIDA
DE AMPLIO ESPECTRO

Tópico
PARA BOVINOS

ECTOLINE

(Fipronil)

RED

Con coloración roja que identifica al animal tratado por 3 a 5 días.
La intensidad varía de acuerdo al color y tipo de pelaje.

Múltiple acción: combate
la garrapata, la mosca
paleta, la miasis y
el tórulo.

MEDICAMENTO DE
USO VETERINARIO

Contenido Neto:
1.000 mL



ALTO: LEA ESTA
ETIQUETA ANTES
DE USAR EL
PRODUCTO.

Boehringer
Ingelheim

CUIDADO- LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

Code: 150865-002



Cancel And Replace: 603004780

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED LABEL 1000 ML FRENTE

COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)

DIMENSIONS mm 124,6 x 82,1

Inches 4 11/16 x 3 1/4

PKG-ES 440018

Colors [Please use the official Pantone color matching system for an accurate color representation.]

P 294 P 293 P 485 PROCESS BLUE
BLACK CUT VARNISH NO PRINT

Version A - 13 NOV 2018 - 03 INTEGRATION

Paulinia
JP

NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Carlos Malagón
21-NOV-2019

Regulatory approval:

Marisel Valdez
22-Oct-2019

Additional approval: (if applicable)

Mariana Sancio. 09-Jan-2020



APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JOSE PABLO
SOLANO RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2022.10.28
09:18:41 -06'00'

Número de lote, fecha de
fabricación y fecha de caducidad:

RESERVED
AREA

ECTOLINE®

(Fipronil) FORMA FARMACÉUTICA: Solución
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica
CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA: Ectoparasitocida

USO VETERINARIO

FÓRMULA CUANTITATIVA: Cada 100 mL contiene:
Fipronil 1,0 g
Citrate de acetyltributyl (SP 22) 30,0 mL
Eter Graso de 15-polioxiopropileno (UX Arlamol E) 5,0 mL
Colorante Diazotado Rojo 0,04 g
Aceite de soja c.s.p. 100,00 mL

PERIODO DE RETIRO

• No sacrificar animales cuya carne se destine al consumo humano hasta transcurridos 100 días del último tratamiento. • No usar en vacuno lechero cuya leche se destine al consumo humano.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES DE USO

• ECTOLINE es exclusivo para bovinos. No utilizar en otras especies animales. • En las condiciones normales de uso, el producto no presenta efectos colaterales para los seres humanos que lo manipulen y animales a los cuales se destina. Manipular con cuidado. No beber, fumar o comer durante su aplicación. • Uso externo. No administrar por vía oral o inyectable. • El intervalo entre tratamientos debe ser de al menos dos meses. • Conservar en local seco y fresco, al abrigo de la luz solar, en temperatura ambiente (15°C - 30°C). • No re-utilizar el envase vacío. • No almacenar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos. • Lavar las manos y la piel expuesta al producto después de su uso. Si se produce contacto accidental con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar los ojos inmediatamente con agua. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica: Tel: (506) 2223-10-28
Centro Integral de Atención Toxicológica de Guatemala: Tel: 1801-0029832
Centro Toxicológico en El Salvador: HOSPITAL ROSALES 2231-9200 EXT. 514

Atención a clientes en México, Centroamérica y Caribe:

01800 400 GANA (4562)
AHGanadadMexico.MX@boehringer-ingelheim.com

Consulte a su médico veterinario.

Venta bajo receta médica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ALMACENAJE Y DESECHOS: No contaminar el agua, comida o alimentos durante el almacenaje o desecho.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (15°C-30°C), protegido de la luz, utilizando el contenedor original solamente.

Esquema práctico de dosificación										
0 - 100	150	200	250	300	350	400	450	500		
10	15	20	25	30	35	40	45	50		

Peso corporal (kg)

Dosis / mL

TRANSPORTE: Transportar por separado los alimentos, forrajes, medicamentos o productos personales.

DISPOSICIÓN DEL PESTICIDA: El desperdicio resultante del uso de este producto, puede ser desechado en un lugar aprobado para tirar basura.

DISPOSICIÓN DEL CONTENEDOR: Envuelva el contenedor original con varias capas de papel periódico y descártelo tirándolo a la basura. No tirar en cursos de agua porque puede afectar a invertebrados acuáticos.

DOSIS Y ESPECIES PARA LAS QUE ESTÁ INDICADO

Para uso en bovinos. Aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo. Aplicar ECTOLINE típicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

Contiene 1% p/v de fipronil. ECTOLINE es un producto garrapaticida e insecticida que se presenta en una formulación de bajo volumen ya lista para ser usada.

INDICACIONES

ECTOLINE tónico para bovinos está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos externos de los bovinos de carne: garrapatas (*Boophilus microplus*), torsalo (*Dermatobia hominis*), piojos masticadores (*Demalima bovis*) y chupadores (*Lingnistrus vituli*) y mosca paletera (*Haematobia irritans*). También está indicado para la prevención de gusaneras causadas por *Cochliomyia hominivorax* especialmente en tiempos de alto riesgo como, por ejemplo, durante la castración.

Para resultados óptimos ECTOLINE debe aplicarse a todos los animales del rebaño dentro de un programa planificado de control de los parásitos externos.

El intervalo de tratamiento debe ser de al menos 2 meses. Consulte a su veterinario o entomólogo local para determinar el momento más oportuno de tratamiento.

Fabricado en Brasil por Ipanema - Industria de Produtos Veterinarios, Rodovia Raposo Tavares, km 113, bairro Barreiro, Aracaju da Serra, SP, para **Boehringer**

Ingelheim Animal Health do Brasil, Fazenda São Francisco, Paulínia, SP

Importa y distribuye:

Perú - Boehringer Ingelheim Perú S.A.C. - Av. Canalay y

Moreyra 480 Piso 20 Lima 27 - Perú RUC N° 20523163320

- Tel: (01) 412-5000 **Nicaragua** - Elaborado por Ipanema,

Industria de Produtos Veterinarios Ltda, para **Boehringer**

Ingelheim Vetmedica GmbH.

Registro Sanitario: Costa Rica: Reg. M.A.G. BR26-43-10-5730

El Salvador: VET 99-10-1902

Guatemala: Reg. MAGA No. BR558-43-02-3287

Honduras: IP-380

Nicaragua: 4993

Panamá: RF-901-19

República Dominicana: 3255

Perú: SENASA F.07.08.10397

© Marca registrada del Grupo Boehringer Ingelheim.

© Derechos reservados del grupo Boehringer Ingelheim.

150867-002

Code: 150867-003



Cancel And Replace: 150867-002

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED LABEL 1000 ML (BACK)

COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)

DIMENSIONS mm = 124,6 x 82,1

Inches = N/A

PKG-ES = 40018

Colors Please use the official PANTONE® (P) matching system for an accurate color representation.

P 294 P 485 PROCESS BLUE BLACK
CUT VARNISH NO PRINT

Version A - 06 MAR 20 - SAS CHANGES

Paulina
JP

NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Regulatory approval:

Additional approval: (if applicable)



APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOSE PABLO SOLANO
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.10.28 09:19:31
+06'00'

**GARRAPATICIDA E INSECTICIDA
DE AMPLIO ESPECTRO**

Tópico
PARA BOVINOS

ECTOLINE[®]

(Fipronil)

RED

Con coloración roja que identifica al animal tratado por 3 a 5 días.
La intensidad varía de acuerdo al color y tipo de pelaje.



**Múltiple acción: combate
la garrapata, la mosca
paletera, la miasis y
el tórsalo.**

**MEDICAMENTO DE
USO VETERINARIO**

**Contenido Neto:
5.000 mL**

**ALTO: LEA ESTA
ETIQUETA ANTES
DE USAR EL
PRODUCTO.**



**Boehringer
Ingelheim**

150871-002

CUIDADO- LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

Code: 150871-002



Cancel And Replace: 603004782

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED LABEL 5000 ML (FRONT)

COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)

DIMENSIONS mm = 193 x 227 mm

inches = 7 1/2 x 9

PKG-ES = 40003

Colors Please use the official Pantone® (P) matching system for an accurate color representation.

P 294 P 293 P 485 PROCESS BLUE

BLACK CUT VARNISH NO PRINT

Version A - 13 NOV 2018 - BE INTEGRATION

Paulina

JP

RELEASE

NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Carlos Malagón
21.NOV-2019

Regulatory approval:

Mariel Valdez
22-Oct-2019

Additional approval: (if applicable)

Mariana Sancio. 09-Jan-2020



APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE
PABLO SOLANO RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2022.10.28 09:18:05 -06'00'

Número de lote, fecha de
fabricación y fecha de caducidad:

FORMA FARMACÉUTICA:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA:

Solución
Tópica
Ectoparasitocida

ECTOLINE

(Fipronil)

USO VETERINARIO

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA: Cada 100 mL contiene:
Fipronil 1,0 g
Citrato de acetiltributyl (SP 22) 30,00 mL
Éter Graso de 15-polioisopropileno (UX Arlamol E) .. 5,0 mL
Colorante Diazoico Rojo 0,04 g
Aceite de soja c.s.p. 100,00 mL

PERIODO DE RETIRO

- No sacrificar animales cuya carne se destine al consumo humano hasta transcurridos 100 días del último tratamiento.
- No usar en vacuno lechero cuya leche se destine al consumo humano.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES DE USO

- ECTOLINE es exclusivo para bovinos. No utilizar en otras especies animales.
- En las condiciones normales de uso, el producto no presenta efectos colaterales para los seres humanos que lo manipulan y animales a los cuales se destina. Manipular con cuidado. No beber, fumar o comer durante su aplicación.
- Uso externo. No administrar por vía oral o inyectable.
- El intervalo entre tratamientos debe ser de al menos dos meses.
- Conservar en local seco y fresco, al abrigo de la luz solar, en temperatura ambiente (15°C - 30°C).
- No re-utilizar el envase vacío.
- No almacenar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos.
- Lavar las manos y la piel expuesta al producto después de su uso. Si se produce contacto accidental con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar los ojos inmediatamente con agua.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica
Tel: (506) 2223-10-28
Centro Integral de Atención Toxicológica de Guatemala
Tel: 1801-0029832
Centro Toxicológico en El Salvador: HOSPITAL ROSALES
2231-9200 EXT. 514

Atención a clientes en México, Centroamérica y Caribe:
01800 400 GANA (4562)
AHGanadeniaMexico.MX@boehringer-ingenheim.com
Consulte a su médico veterinario.
Venta bajo receta médica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ALMACENAJE Y DESECHOS: No contaminar el agua, comida o alimentos durante el almacenaje o desecho.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (15°C-30°C), protegido de la luz, utilizando el contenedor original solamente.

TRANSPORTE: Transportar por separado los alimentos, forrajes, medicamentos o productos personales. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. **DISPOSICIÓN DEL PESTICIDA:** El desperdicio resultante del uso de este producto, puede ser desechado en un lugar aprobado para tirar basura.

DISPOSICIÓN DEL CONTENEDOR: Envuelva el contenedor original con varias capas de papel periódico y descártelo tirándolo a la basura. No tirar en cursos de agua porque puede afectar a invertebrados acuáticos.

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

DOSIS Y ESPECIES PARA LAS QUE ESTÁ INDICADO: Para uso en bovinos. Aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por cada kilo.

Aplicar ECTOLINE tópicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

PESO (kg)	DOSIS (mL)
hasta 100	10
150	15
200	20
250	25
300	30
350	35
400	40
450	45
500	50

© Marca registrada del Grupo Boehringer Ingelheim.
© Derechos reservados del grupo Boehringer Ingelheim.

Contiene 1% p/v de fipronil. ECTOLINE es un producto garrapaticida e insecticida que se presenta en una formulación de bajo volumen ya lista para ser usada.

INDICACIONES

ECTOLINE Tópico para bovinos está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos externos de los bovinos de carne: garrapatas (*Boophilus microplus*), tórsalo (*Dermatobia hominis*), piojos masticadores (*Damalinea bovis*) y chupadores (*Linognathus vituli*) y mosca paletera (*Haematobia irritans*). También está indicado para la prevención de gusaneras causadas por *Cochliomyia hominivorax* especialmente en tiempos de alto riesgo como, por ejemplo, durante la castración.

Para resultados óptimos ECTOLINE debe aplicarse a todos los animales del rebaño dentro de un programa planificado de control de los parásitos externos. El intervalo de tratamiento debe ser de al menos 2 meses. Consulte a su veterinario o entomólogo local para determinar el momento mas oportuno de tratamiento.

Fabricado en Brasil por Ipanema - Industria de Produtos Veterinarios, Rodovia Raposo Tavares, km 113, barrio Barreiro, Aracoiaba da Serra, SP, para **Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil**. Fazenda São Francisco, Paulínia, SP

Importa y distribuye:

América Central y Caribe

Merial América Central y Caribe
3239 Satellite Blvd. Building 500 - Duluth, GA 30096
Tel. 678-638-3695 - Fax 678-638-3696

Perú - Boehringer Ingelheim Perú S.A.C. - Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 20 Lima 27 - Perú RUC N° 20523163320
- Tel: (01) 412-5000 **Nicaragua** - Elaborado por Ipanema, Industria de Produtos Veterinarios Ltda, para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Registro Sanitario:

Costa Rica: Reg. M.A.G. BR28-43-10-5730
El Salvador: VET 99-10-1902
Guatemala: Reg. MAGA No. BR558-43-02-3287
Honduras: IP-360
Nicaragua: 4993
Panamá: RF-901-19
República Dominicana: 3255
Perú: SENASA F.07.08.1.0397



**Boehringer
Ingelheim**

150872-002

Code: 150872-003

Cancel And Replace: 150872-002

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED LABEL 5000 ML (VERSE)

COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)

DIMENSIONS: mm = 150 x 227

INCHES = N/A

PWG-ES = 40003

Colors: see the photo/attach to the order form for all colors and quantities

P 204 P 485 ACCESS BLUE BLACK
CUT VARNISH NO PRINT

Version: A - 05 MAR 20 - SAS CHANGES

Paulina JP

NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Regulatory approval:

Additional approval: (if applicable)



