

150865-002

GARRAPATICIDA E INSECTICIDA
DE AMPLIO ESPECTRO

Tópico

PARA BOVINOS

ECTOLINE®

(Fipronil)

RED

Con coloración roja que identifica al animal tratado por 3 a 5 días.
La intensidad varía de acuerdo al color y tipo de pelaje.

Múltiple acción: combate
la garrapata, la mosca
paleta, la miasis y
el térsalo.

MEDICAMENTO DE
USO VETERINARIO

ALTO: LEA ESTA
ETIQUETA ANTES
DE USAR EL
PRODUCTO.

Boehringer
Ingelheim

Contenido Neto:

1.000 mL

CUIDADO- LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

Code: 150865-002

Cancel And Replace: 603004780

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED LABEL 1000 ML FRENTE	COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)	DIMENSIONS	mm ~124,6 x 82,1	inches ~N/A	PKG-ES - 40018
--	--	------------	------------------	-------------	----------------

Colors P 294 P 293 P 455 PROCESS BLUE BLACK CUT VARNISH NO PRINT	Version A - 13 NOV 2019 - B1 INTEGRATION Paulinia JP RELEASE:	NOTE FOR THE SUPPLIER: N/A
---	---	--

Marketing approval:	Regulatory approval:	Additional approval: (if applicable)
---------------------	----------------------	--------------------------------------

Boehringer
Ingelheim

Número de lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad:

RESERVED
AREA

ECTOLINE

(Fipronil) FORMA FARMACÉUTICA: Solución
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica
CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA: Ectoparasitocida

USO VETERINARIO

Fórmula Cuilcuintativa: Cada 100 mL contiene:

Fipronil	1,0 g
Citrato de acetiltributril (SP 22)	30,0 mL
Eter Graso de 15-polioctopropileno (UX Alfamol E)	5,0 mL
Colorante Diazocal Rojo	0,04 g
Aceite de soja	c.s.p. 100,00 mL

PERIODO DE RETIRO

• No sacrificar animales cuya carne se destine al consumo humano hasta transcurridos 100 días del último tratamiento. • No usar en vacuno lechero cuya leche se destine al consumo humano.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES DE USO

• ECTOLINE es exclusivo para bovinos. No utilizar en otras especies animales. • En las condiciones normales de uso, el producto no presenta efectos colaterales para los seres humanos que lo manipulen y animales a los cuales se destina. Manipular con cuidado. No beber, fumar o comer durante su aplicación. • Uso externo. No administrar por vía oral o inyectable. • El intervalo entre tratamientos debe ser de al menos dos meses. • Conservar en local seco y fresco, al abrigo de la luz solar, en temperatura ambiente (15°C - 30°C). • No reutilizar el envase vacío. • No almacenar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos. • Lavar las manos y la piel expuesta al producto después de su uso. Si se produce contacto accidental con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar los ojos inmediatamente con agua. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUELE ESTA ETIQUETA.

Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica: Tel: (506) 2233-10-28
Centro Integral de Atención Toxicológica de Guatemala Tel: 1801-0029832
Centro Toxicológico en El Salvador: HOSPITAL ROSALES 2231-9200 EXT. 514

Atención a clientes en México, Centroamérica y Caribe:

01800 400 GANA (4562)

AHGanaderiaMexico.MX@boehringer-ingenheim.com

Consulte a su médico veterinario.

Venta bajo receta médica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ALMACENAJE Y DESECHO: No contaminar el agua, comida o alimentos durante el almacenamiento o desecho.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (15°C-30°C), protegido de la luz, utilizando el contenedor original solamente.

TRANSPORTE: Transportar por separado los alimentos, forrajes, medicamentos o productos personales.

DISPOSICIÓN DEL PESTICIDA: El desperdicio resultante del uso de este producto, puede ser desechado en un lugar aprobado para tirar basura.

DISPOSICIÓN DEL CONTENEDOR: Envuelva el contenedor original con varias capas de papel periódico y deséchelo tirándolo a la basura. No tirar en cursos de agua porque puede afectar a invertebrados acuáticos.

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

DOSIS Y ESPECIES PARA LAS QUE ESTÁ INDICADO

Para uso en bovinos: Aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo. Aplicar ECTOLINE típicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

Contiene 1% p/v de fipronil. ECTOLINE es un producto garrapaticida e insecticida que se presenta en una formulación de bajo volumen ya lista para ser usada.

INDICACIONES

ECTOLINE tónico para bovinos está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos externos de los bovinos de carne, garrapatas (*Dermophis micropus*), tosojal (*Dermatobia hominis*), piojos masticadores (*Psammalia bovis*) y chupadores (*Limognathus vituli*) y mosca pailetera (*Haematobia irritans*). También está indicado para la prevención de gusaneras causadas por *Cochliomyia hominivorax* especialmente en tiempos de alto riesgo como, por ejemplo, durante la castración.

Para resultados óptimos ECTOLINE debe aplicarse a todos los animales del rebaño dentro de un programa planificado de control de los parásitos externos. El intervalo de tratamiento debe ser de al menos 2 meses.

Consulte a su veterinario o entomólogo local para determinar el momento más oportuno de tratamiento.

Fabricado por: Industria de Productos Veterinarios Ltda Rodolfo Raposo Lavares km 113, Barro Barreiro, Aracaciaba de Serra, SP para Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Importa y distribuye:

Perú - Boehringer Ingelheim Perú S.A.C. - Av. Canaval y Moyreya 480 Piso 20 Lima 27 - Perú HUC N° 20523163320
Tel: (011) 412-5000 **Nicaragua** - Elaborado por Ipanema, Industria de Productos Veterinarios Ltda, para Boehringer Ingelheim Veterinaria GmbH.

Registro Sanitario:

Costa Rica: Reg. MAG MV-5730

El Salvador: VET 99-10-1902

Guatemala: Reg. MAGA BR558-43-02-15667

Honduras: MV-3-360

Nicaragua: MV-4993

Panamá: H-501-19

República Dominicana: 3255

Perú: SENASA F.07.081.0397

© Marca registrada del Grupo Boehringer Ingelheim.
© Derechos reservados del grupo Boehringer Ingelheim.

Esquema práctico de dosificación										
0 - 100	150	200	250	300	350	400	450	500		
0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	

Peso corporal (kg)

Dosis / mL



Boehringer
Ingelheim

GO PAULINA

INITIALS: PS

Code: 150867-004

SKU #: 128371

Version: C - 20/07/2022

Product
Component Type Size

ECTOLINE RED
Verse Label 1L

Country(s): Central America Region / Peru (CAM PE)

Dimensions: 124,6 x 82,1 mm

Font Size: N/A

IL/PR: CAPA 1189043 - CR-001212

Release:

PKG-ES #: 95068

CANCEL AND REPLACE: 150867-003

Notes:

COLORS

BLACK P 294

P 485 Process Blue

FINISHING (if applicable)

Varnishes

TECH INFO (not printed)

NO PRINT

Dieline

150867-7-004

GARRAPATICIDA E INSECTICIDA
DE AMPLIO ESPECTRO

Tópico
PARA BOVINOS

ECTOLINE[®]

(Fipronil)

RED

Con coloración roja que identifica al animal tratado por 3 a 5 días.
La intensidad varía de acuerdo al color y tipo de pelaje.



Múltiple acción: combate
la garrapata, la mosca
paletera, la miasis y
el tórsalo.

MEDICAMENTO DE
USO VETERINARIO

Contenido Neto:
5.000 mL

**ALTO: LEA ESTA
ETIQUETA ANTES
DE USAR EL
PRODUCTO.**



Boehringer
Ingelheim

150871-002

CUIDADO- LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

Code: 150871-002		Cancel And Replace: 603004782	
PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED LABEL 5000 ML (FRONT)		COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)	
DIMENSIONS mm =193 x 227 mm		inches =N/A	
PKG-ES =40003			
Colors Please use the official PANTONE®(P) matching system for an accurate color representation.		Version A - 13 NOV 2018 - BE INTEGRATION	
P 294 P 293 P 485 PROCESS BLUE		Paulinia	
BLACK CUT VARNISH NO PRINT		JP	
Marketing approval:		Regulatory approval:	
Additional approval: (if applicable)		N/A	
		Boehringer Ingelheim	

Número de lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad:

RESERVED
AREA

FORMA FARMACÉUTICA:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA:

Solución
Tópica
Ectoparasitocida

ECTOLINE®

(Fipronil)

USO VETERINARIO

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA: Cada 100 mL contiene:
Fipronil 1,0 g
Citrato de acetiltributil (SP 22) 30,00 mL
Éter Graso de 15-polioxiopropileno (UX Arlarmol E) .. 5,0 mL
Colorante Diazóico Rojo 0,04 g
Aceite de soja c.s.p. 100,00 mL

PERIODO DE RETIRO

- No sacrificar animales cuya carne se destine al consumo humano hasta transcurridos 100 días del último tratamiento.
- No usar en vacuno lechero cuya leche se destine al consumo humano.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES DE USO

- ECTOLINE es exclusivo para bovinos. No utilizar en otras especies animales.
- En las condiciones normales de uso, el producto no presenta efectos colaterales para los seres humanos que lo manipulen y animales a los cuales se destina. Manipular con cuidado. No beber, fumar o comer durante su aplicación.
- Uso externo. No administrar por vía oral o inyectable.
- El intervalo entre tratamientos debe ser de al menos dos meses.
- Conservar en local seco y fresco, al abrigo de la luz solar, en temperatura ambiente (15°C - 30°C).
- No re-utilizar el envase vacío.
- No almacenar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos.
- Lavar las manos y la piel expuesta al producto después de su uso. Si se produce contacto accidental con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar los ojos inmediatamente con agua.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica
Tel: (506) 2223-10-28
Centro Integral de Atención Toxicológica de Guatemala
Tel: 1801-0029832
Centro Toxicológico en El Salvador: HOSPITAL ROSALES
2231-9200 EXT. 514

Atención a clientes en México, Centroamérica y Caribe:
01800 400 GANA (4562)
AHGanaderiaMexico.MX@boehringer-ingelheim.com
Consulte a su médico veterinario.
Venta bajo receta médica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ALMACENAJE Y DESECHOS: No contaminar el agua, comida o alimentos durante el almacenaje o desecho.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (15°C-30°C), protegido de la luz, utilizando el contenedor original solamente.

TRANSPORTE: Transportar por separado los alimentos, forrajes, medicamentos o productos personales. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

DISPOSICIÓN DEL PESTICIDA: El desperdicio resultante del uso de este producto, puede ser desechado en un lugar aprobado para tirar basura.

DISPOSICIÓN DEL CONTENEDOR: Envuelva el contenedor original con varias capas de papel periódico y descártelo tirándolo a la basura. No tirar en cursos de agua porque puede afectar a invertebrados acuáticos.

El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos.

ESQUEMA PRÁCTICO DE DOSIFICACIÓN	
PESO (kg)	DOSIS (mL)
hasta 100	10
150	15
200	20
250	25
300	30
350	35
400	40
450	45
500	50

© Marca registrada del Grupo Boehringer Ingelheim.
© Derechos reservados del grupo Boehringer Ingelheim.

DOSIS Y ESPECIES PARA LAS QUE ESTÁ INDICADO:
Para uso en bovinos. Aplicar 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por cada kilo.

Aplicar ECTOLINE tópicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola. Contiene 1% p/v de fipronil. ECTOLINE es un producto garrapaticida e insecticida que se presenta en una formulación de bajo volumen ya lista para ser usada.

INDICACIONES

ECTOLINE Tópico para bovinos está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos externos de los bovinos de carne: garrapatas (*Boophilus microplus*), tórsoa (*Dermatobia hominis*), piojos masticadores (*Damalinea bovis*) y chupadores (*Linognathus vituli*) y mosca paletera (*Haematobia irritans*). También está indicado para la prevención de gusaneras causadas por *Cochliomyia hominivorax* especialmente en tiempos de alto riesgo como, por ejemplo, durante la castración.

Para resultados óptimos ECTOLINE debe aplicarse a todos los animales del rebaño dentro de un programa planificado de control de los parásitos externos. El intervalo de tratamiento debe ser de al menos 2 meses. Consulte a su veterinario o entomólogo local para determinar el momento mas oportuno de tratamiento.

Fabricado por Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Rodovia Raposo Tavares, km 113, Bairro Barreiro, Araçoiaba da Serra, SP, para **Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.**

Importa y distribuye:

Perú - Boehringer Ingelheim Perú S.A.C. - Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 20 Lima 27 - Perú RUC N° 20523163320 - Tel: (01) 412-5000 **Nicaragua** - Elaborado por Ipanema, Indústria de Produtos Veterinários Ltda, para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Registro Sanitario:

Costa Rica: Reg. MAG MV-5730
El Salvador: VET 99-10-1902
Guatemala: Reg. MAGA BR558-43-02-15667
Honduras: MV-3-360
Nicaragua: MV-4993
Panamá: RF-901-19
República Dominicana: 3255
Perú: SENASA F.07.08.I.0397



Boehringer
Ingelheim

150872-004

	Code: 150872-004	COLORS
GO PAULINIA	SKU #: 130223	BLACK P 294
INITIALS: PS	Version: C - 20/07/22	Process Blue P 485
Product	Ectoline Red	
Component Type Size	Verse Label 5L	
Country(s):	Central America / Peru (CAM/PE)	
Dimensions :	193 x 227 mm	
Font Size:	NA	
IL/PR:	CAPA 1189046 - CR-001212	
Release:		
PKG-ES #:	95060	
CANCEL AND REPLACE:	150872-003	
Notes:		
		FINISHING (if applicable)
		Varnishes
		TECH INFO (not printed)
		NO PRINT
		Dieline



MEDICAMENTO DE
USO VETERINARIO

130223

RESERVED AREA
FOR INKJET

PART.:
ELAB.:
CADU.:

288 – Ectoline 5 litros

Nicaragua: Elaborado por Ipanema, Indústria de Produtos Veterinários Ltda, para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Contains 20 ltrs. (4 x 5 ltr.)
Contains 5,283 gal. (4 x 1,321 gal.)

EPA Est. No. 92411-BRA-1

ACTIVE INGREDIENTS:

Fipronil:.....1,0%
Other Ingredients:.....99,0%

FIRST AID MEASURES

EYE CONTACT: Verify if individual uses contact lenses and remove if necessary. With your eyes open wash them thoroughly with plenty of water for 20 minutes. Use of the eye washing machine is preferable. Seek medical attention immediately, if possible take a product label with you. **SKIN CONTACT:** Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush skin with plenty of running water for at least 20 minutes, preferable to use the emergency shower machine. Seek medical attention immediately, if possible take a product label with you. **INHALATION:** With this formulation the risk of inhalation is improbable unless caused by nebulization. **INGESTION:** If swallowed, do NOT induce vomiting. If victim is totally conscious, clean the mouth with plenty of clean water. Seek medical attention immediately.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ECTOLINE is for use in beef cattle. Do not slaughter animals whose meat is destined for human consumption until 100 days after the last treatment. Do not administer to cattle producing milk for human consumption. Keep the product stored in a cool place, protected from light, away from food and medicines, and out of reach of children.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS - CAUTION

Not registered for use in the United States of America

288 – Ectoline 5 litros

Nicaragua: Elaborado por Ipanema, Indústria de Produtos Veterinários Ltda, para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Contenido 20 lts. (4 x 5 ltr)
Contenido 5,283 gal. (4 x 1,321 gal.)

EPA Est. No. 92411-BRA-1

INGREDIENTES ACTIVOS:

Fipronil:.....1,0%
Otros Ingredientes:.....99,0%

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Primero verificar si la víctima porta lentillas y en este caso retirárselas. Lavar los ojos con agua limpia corriente en abundancia durante al menos 20 minutos con los párpados abiertos. De preferencia usar un lavaojos. Obtenga atención médica inmediatamente, si posible llevando una etiqueta del producto. **CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar inmediatamente las ropas y zapatos contaminados. Lavar la piel con agua limpia corriente en abundancia durante al menos 20 minutos, de preferencia bajo una ducha de emergencia. Buscar atención médica inmediatamente, si posible llevando una etiqueta del producto, si acaso algún síntoma aparece. **INHALACIÓN:** En la formulación que es presentada, el riesgo de inhalación es improbable, a menos que el usuario lo haga por nebulización. **INGESTIÓN:** No inducir el vómito. Si la víctima está totalmente consciente, lavar su boca con agua limpia en abundancia. Obtenga atención médica inmediatamente.

PRECAUCIONES

ECTOLINE se debe usar en ganado vacuno. No sacrificar animales si la carne está destinada para consumo humano sino hasta 100 días después del último tratamiento. No debe administrarse a ganado productor de leche destinado a consumo humano. Manténgase en un lugar fresco, no expuesto a la luz, y separado de alimentos y medicamentos y fuera del alcance de los niños.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS - PRECAUCIÓN

Producto no registrado para uso en los Estados Unidos de América

148390-002

Code: 148390-002



Cancel And Replace: 603004349

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED SHIPPER LABEL 4 x 5L

COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)

DIMENSIONS mm = 170 X 90 mm


inches = N/A

PKG-ES = 40012

Colors Please use the official Pantone® (P) matching system for an accurate color representation.



Version A - 13 NOV 2018 - BE INTEGRATION
B - 10 JAN 2019 - 15005 - text changes - G1



NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Regulatory approval:

Additional approval: (if applicable)





MEDICAMENTO DE
USO VETERINARIO

128371

RESERVED AREA
FOR INKJET

PART.:
ELAB.:
CADU.:

13 – Ectoline 1 liter

Nicaragua: Elaborado por Ipanema, Indústria de Produtos Veterinários Ltda, para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Contains 10 ltrs. (10 x 1 ltr.)
Contains 2,642 gal. (10 x 0,264 gal.)

EPA Est. No. 92411-BRA-1

ACTIVE INGREDIENTS:

Fipronil:.....1.0%
Other Ingredients:.....99.0%

FIRST AID MEASURES

EYE CONTACT: Verify if individual uses contact lenses and remove if necessary. With your eyes open wash them thoroughly with plenty of water for 20 minutes. Use of the eye washing machine is preferable. Seek medical attention immediately, if possible take a product label with you. **SKIN CONTACT:** Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush skin with plenty of running water for at least 20 minutes, preferable to use the emergency shower machine. Seek medical attention immediately, if possible take a product label with you. **INHALATION:** With this formulation the risk of inhalation is improbable unless caused by nebulization. **INGESTION:** If swallowed, do NOT induce vomiting. If victim is totally conscious, clean the mouth with plenty of clean water. Seek medical attention immediately.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
ECTOLINE is for use in beef cattle. Do not slaughter animals whose meat is destined for human consumption until 100 days after the last treatment. Do not administer to cattle producing milk for human consumption. Keep the product stored in a cool place, protected from light, away from food and medicines, and out of reach of children.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS - CAUTION
Not registered for use in the United States of America

13 – Ectoline 1 litro

Nicaragua: Elaborado por Ipanema, Indústria de Produtos Veterinários Ltda, para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Contenido 10 lts. (10 x 1 ltr)
Contenido 2,642 gal. (10 x 0,264 gal.)

EPA Est. No. 92411-BRA-1

INGREDIENTES ACTIVOS:

Fipronil:.....1,0%
Otros Ingredientes:.....99,0%

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Primero verificar si la víctima porta lentillas y en este caso retirárselas. Lavar los ojos con agua limpia corriente en abundancia durante al menos 20 minutos con los párpados abiertos. De preferencia usar un lavajos. Obtenga atención médica inmediatamente, si posible llevando una etiqueta del producto. **CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar inmediatamente las ropas y zapatos contaminados. Lavar la piel con agua limpia corriente en abundancia durante al menos 20 minutos, de preferencia bajo una ducha de emergencia. Buscar atención médica inmediatamente, si posible llevando una etiqueta del producto, si acaso algún síntoma aparece. **INHALACIÓN:** En la formulación que es presentada, el riesgo de inhalación es improbable, a menos que el usuario lo haga por nebulización. **INGESTIÓN:** No inducir el vómito. Si la víctima está totalmente consciente, lavar su boca con agua limpia en abundancia. Obtenga atención médica inmediatamente.

PRECAUCIONES

ECTOLINE se debe usar en ganado vacuno. No sacrificar animales si la carne está destinada para consumo humano sino hasta 100 días después del último tratamiento. No debe administrarse a ganado productor de leche destinado a consumo humano. Manténgase en un lugar fresco, no expuesto a la luz, y separado de alimentos y medicamentos y fuera del alcance de los niños.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS - PRECAUCIÓN
Producto no registrado para uso en los Estados Unidos de América

148389-002

Code: 148389-002



Cancel And Replace: 603004326

PRODUCT: ECTOLINE POUR-ON RED SHIPPER LABEL 10 x 1L

COUNTRY: CENTRAL AMERICA / PERU (CAM-PE)

DIMENSIONS

mm =170 X 90 mm

inches =N/A

PWG-ES =40012

Colors

Please use the official Pantone®(P) matching system for an accurate color representation.

P 294

P 485

PROCESS BLUE

CUT

VARNISH

NO PRINT

Version

A - 13 NOV 2018 - BE INTEGRATION

B - 10 JAN 2019 - 15H15 - text changes - GJ

Paulinia

JP

RELEASE

NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Regulatory approval:

Additional approval: (if applicable)

