

Servicio
Nacional de
Salud Animal **APROBADO**
MAG • COSTA RICA

Dirección de Medicamentos Veterinarios

Formula, indications, posology, dosage, route of administration, adverse effects, interactions, withdrawal period, special precautions and warnings: See leaflet inside.
Product designed for sport horses.
Avoid use in horses devoted to human consumption. Keep out the reach of children, pets and people with disabilities.
Store below 30 °C.
CAUTION: This drug is restricted to use by or on the order of a licensed veterinarian.

ARTIDEXA CHINFIELD®

SOLUCION INYECTABLE

Dexametasona 21 fosfato 2 g
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml

USO VETERINARIO

VENTA CON RECETA VETERINARIA
CONTENIDO: 5 unidades x 2ml c/u (40 mg / 2 ml)
INDUSTRIA ARGENTINA

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR CHINFIELD S.A.
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
Av. Ader 3205 (1605) Munro - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-4762-5163
E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com



7 798196 620104

SENASA Cert N° 06-412
Estab. Elab. N° 5491
Director Técnico:
Dr. Juan C. Sosa
M. V. Mat. N° 2986
Panamá MV-9211-22
Reg. SENACSA 12357 PY
Guatemala N° AR849-14-08-13185
Costa Rica Reg. MAG: MV-5078
Uruguay MGAP 2021A00961

Indicaciones: Antiinflamatorio esteroide.
Dosis: 0,08 mg/kg.p.v. Inyectable
EV, IM, IA, Periartricular, Intrasinovial. Infiltraciones locales.
Contraindicaciones, Efectos adversos, Precauciones: Ver prospecto adjunto.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Buenos Aires - Argentina.
Debe ser aplicado por Médico Veterinario
Conservar por debajo de 30° C y al abrigo de la luz. No congelar.

0323

ARTIDEXA CHINFIELD®

ARTIDEXA CHINFIELD®

INJECTABLE SOLUTION

Dexamethasone 21 phosphate 2 g
Formulation agents q.s. 100 ml

VETERINARY USE

CONTENT: 5 units x 2 ml each. (40 mg / 2 ml)
MADE IN ARGENTINA

ELABORATED & DISTRIBUTED BY CHINFIELD S.A.
VETERINARY LABORATORY INDUSTRY
Av. Ader 3205 (1605) Munro - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-4762-5163
E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com



ARTIDEXA CHINFIELD®

INDUSTRIA ARGENTINA - 2ml

Conservar por debajo de 30 °C. No congelar.

Reg. SENASA N° 06-412

RF-9211-22 Panamá

Reg. SENACSA 12357 Paraguay

Guatemala AR49-14-08-1816

Costa Rica Reg.MAG:MV-5078

INDUSTRIA ARGENTINA

USO VETERINARIO

ARTIDEXA CHINFIELD®

SOLUCION INYECTABLE

Dexametasona 21 fosfato.....2 g

Agentes de formulación c.s.p..... 100 ml

ACCION TERAPEUTICA: Antiinflamatorio esteroide.**ESPECIES DE DESTINO:** Equinos no destinados a consumo alimentario humano.**INDICACIONES:** Manifestaciones alérgicas o inflamatorias, localizadas o generalizadas. Neuritis, tendinitis, bursitis, artritis, mialgias, eczemas, shock anafiláctico y/o traumático.**DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION:** 2 ml (40 mg) o según criterio profesional de acuerdo a la patología a tratar. Aplicación endovenosa, intramuscular, intraarticular, periarticular, intrasinovial. Infiltraciones locales.**INTERVALO ENTRE DOSIS:**

a) 24 horas para inyección endovenosa o intramuscular.

b) En infiltraciones locales, intrasinoviales, periarticulares e intraarticulares la dosis será repetida según criterio profesional.

c) En caso de shock anafiláctico, endovenoso cada 4 horas o según criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad. Infecciones sistémicas agudas (a menos que esté instaurada terapia antimicrobiana específica). No utilizar cuando se apliquen vacunas de organismos atenuados. No aplicar cuando esté en pleno proceso de cicatrización alguna herida importante dado que esta droga retarda el proceso de reparación. No aplicar en casos de laminitis. No aplicar intraarticular en procesos artríticos sépticos ni en casos de fractura articular.**EFFECTOS ADVERSOS POSIBLES:** Hipercoercitismo producido por dosis elevadas continuadas de corticoides durante un tiempo prolongado. Hipocorticismismo por la supresión abrupta de la droga después de un tratamiento prolongado.

Retardo de los procesos cicatrizales.

En reproducción: Dosis elevadas (más de 100 mg diarios durante 3 días) pueden inducir el parto prematuro no deseado en la yegua en el final del último tercio de la gestación.

También altas dosis y tratamientos largos pueden producir o agravar cuadros de laminitis en el caballo como también el incremento de secreción de ácido clorhídrico y pepsina en el estómago con la consecuente producción de úlceras gástricas.

INTERACCIONES: Anfotericina B o diuréticos depletadores de potasio: su uso conjunto puede producir hipopotasemia. Glucósidos digitálicos: pueden aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada con hipopotasemia. Ácido acetilsalicílico: debe ser utilizado cuidadosamente, especialmente en los estados de hipoprotrombinemia. Isoniazida: su efectividad antituberculosa puede disminuir por aumento del metabolismo hepático, la excreción de isoniazida o de ambos, lo que provoca una disminución de la concentración plasmática de isoniazida, especialmente en aquellos pacientes que son acetiladores rápidos.**PRECAUCIONES:** No administrar a animales en su tercer trimestre de gestación puesto que la dexametasona podría provocar inducción al parto no deseado, aunque las yeguas son muy resistentes a este efecto, ya que se requieren por lo menos dosis de 100 mg de dexametasona IM por tres días consecutivos para lograrlo, debido a que esta droga no atraviesa la barrera placentaria en esta especie.

No administrar en casos de laminitis.

No administrar en casos de úlceras gástricas o duodenales.

EFFECTOS AMBIENTALES: Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.**ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y personas discapacitadas. Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160. Buenos Aires, Argentina.

Debe ser aplicado por Médico Veterinario. Chinfeld S.A. no se responsabiliza por un inadecuado uso o almacenamiento del producto.

PRESENTACION: frasco ampolla de 2 ml (40 mg de dexametasona 21 fosfato)**CONSERVACION:** Conservar por debajo de 30 °C. No congelar.**CLASIFICACION:** Venta bajo receta.

SENASA Cert. N° 06-412

Estab. Elab. N° 5491

Director Técnico Dr. Juan C. Sosa

Médico Veterinario Mat. 2986

RF-9211-22 Panamá

Reg. SENACSA 12357 Paraguay

Guatemala N° AR49-14-08-1816

Costa Rica Reg.MAG: MV-5078



Elaborado y distribuido por **CHINFELD S.A.**
Laboratorio de Especialidades Veterinarias
Av. Ader 3205 (1605) Munro - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-4762-5163.
E-mail: info@chinfeld.com www.chinfeld.com

0122

MADE IN ARGENTINA

VETERINARY USE

ARTIDEXA CHINFIELD®

INJECTABLE SOLUTION

Dexamethasone 21 phosphate.....2 g

Formulation agents q.s..... 100 ml

THERAPEUTIC ACTION: Steroid antiinflammatory.**DESTINATION SPECIES:** Sport equines non destined to human food consumption.**INDICATIONS:** Allergic or inflammatory conditions, localized or general. Neuritis, tendinitis, bursitis, arthritis, mialgias, anaphylactic and/or traumatic shock.**DOSIS AND ROUTES:** 2 ml (40 mg) or according to professional criterion depending on the pathology to treat. Intravenous, intramuscular, intraarticular, periarticular, intrasynovial injection. Local infiltrations.**INTERVAL BETWEEN DOSES:**

a) 24 hours for intravenous or intramuscular injection.

b) In local, intrasynovial, periarticular and intraarticular infiltrations, the dose shall be repeated according to the professional criterion.

c) In case of anaphylactic shock, intravenous every 4 hours or according to professional criterion.

COUNTERINDICATIONS: Hypersensitivity. Acute systemic infections (unless a specific antimicrobial therapy is set). Do not use when attenuated organisms vaccines are administered. Do not administer when some major injury is under healing process because this drug retards the healing process. Do not administer in case of laminitis. Do not administer by intraarticular route in septic arthritic processes or in cases of joint fracture.**POSSIBLE ADVERSE EFFECTS:** Hypercorticism caused by continued high corticoid doses during a prolonged period of time. Hypocorticism due to abrupt discontinuation of the drug after a prolonged treatment.

Retard of healing processes.

In reproduction: High doses (more than 100 mg/day during 3 days) may induce undesired premature birth in the mare at the end of the last quarter of pregnancy.

Also high doses and long-term treatments may cause or worsen laminitis in horses, as well as the increase of hydrochloride acid and pepsin secretion in the stomach with the consequent production of gastric ulcers.

INTERACTIONS: Anfotericin B or potassium depletion diuretics: their concomitant use may cause hypokalemia. Digitalis Glycosides: they may increase the chances of digitalis intoxication associated with hypokalemia. Acetylsalicylic acid: it must be used carefully, especially in hypoprotrombinemia conditions. Isoniazide: its antituberculosis effectiveness may decrease due to an increase of liver metabolism, isoniazide excretion or both, which causes a decrease of isoniazide plasmatic concentration, especially in these patients who are quick acetylators.**PRECAUTIONS:** Do not administer to animals during their first quarter of pregnancy because dexamethasone might cause undesired birth induction, although the mares are very resistant to this effect, since at least 100 mg IM doses of dexamethasone are required, during three consecutive days to achieve it, because this drug does not pass through the placenta barrier in this species.

Do not administer in cases of laminitis.

Do not administer in cases of gastric or duodenal ulcers.

ENVIRONMENTAL EFFECTS: Used containers must be discarded according to current local legislation.**WARNINGS:** Keep away from children, pets and people with disabilities.

It should be administered by a Veterinarian. Chinfeld S.A. is not responsible for improper use or storage of the product.

PRESENTATION: 2 ml vial (40 mg of dexamethasone 21 phosphate)**STORAGE:** Below 30 °C and away from the light.

SENASA Cert. N° 06-412

Lab premises N° 5491

Technical Director: Dr. Juan C. Sosa

V.M. Mat. 2986

PRODUCED AND DISTRIBUTED BY: **CHINFELD S.A.**
VETERINARY PRODUCTS LABORATORY
Av. Ader 3205 (1605) Munro - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-4762-5163 - E-mail: info@chinfeld.com - www.chinfeld.com

