





Bimeda Inc.
Boulevard Los Próceres, 24-69, Zona 10
Empresarial Zona Pradera
Torre II, Nivel 15, Oficina 1512,
Guatemala, C.A. 01010
Tel. 502-2261-7522
Email. servicioalclienteLA@bimeda.com



dolvet®

SOLUCIÓN INYECTABLE

PIROXICAM 20 mg / mL
USO VETERINARIO

ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO



Contenido 10 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Piroxicam 20 mg
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES, DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES. REACCIONES ADVERSAS: Ver información en inserto.


Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Lea el inserto antes de utilizar el producto.

PROPIETARIO Y FABRICANTE: Bimeda Brasil S.A. INDUSTRIA BRASILEÑA	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Ver inserto
---	--

Reg. San. N°:
Guatemala BR467-14-02-15493
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica MV-7496
Panamá

LOTE:
FABRICACIÓN:
VENCIMIENTO:





LOTE: FABRICACIÓN: VENCIMIENTO:	FÓRMULA: Cada mL contiene: Piroxicam 20 mg Excipientes c.s.p.		PERIODO DE VALIDEZ: 02 (dos) años después de la fecha de fabricación. Después de la primera perforación de la tapa el producto puede ser utilizado por hasta 60 días.
	INDICACIONES Afecciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético tales como artritis, bursitis, tendinitis osteoartritis. Traumatismos agudos y crónicos.	SOLUCIÓN INYECTABLE PIROXICAM 20 mg / mL USO VETERINARIO ANTIINFLAMATORIO ANALGÉSICO 	PROPIETARIO Y FABRICANTE: Bimeda Brasil S.A. INDUSTRIA BRASILEÑA
	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES. REACCIONES ADVERSAS: Ver información en inserto.	Contenido 50 mL	Reg. San. N°: Guatemala BR467-14-02-15493 El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica MV-7496 Panamá
	Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.		
	Lea el inserto antes de utilizar el producto.		



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Piroxicam 20 mg
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES

Afecciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético tales como artritis, bursitis, tendinitis osteoartritis. Traumatismos agudos y crugias.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Inyectar vía intramuscular profunda.

CANINOS Y FELINOS: 0.3 mg/Kg 1 vez al día. Dosis de impacto de 0.6 mg/Kg de peso (1 c.c./33 Kg) el primer día y continuar con 0.3 mg/Kg (0.5 c.c./ 33 Kg) por 3 a 5 días.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES: La administración del medicamento deberá ser estrechamente supervisada en pacientes con historia de enfermedad gastrointestinal alta.

Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lea el inserto antes de utilizar el producto.

Lea el inserto antes de utilizar el producto.

LOTE:
FABRICACIÓN:
VENCIMIENTO:

**dolvet**[®]**SOLUCIÓN INYECTABLE****PIROXICAM 20 mg / mL
USO VETERINARIO****ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO****Contenido 100 mL**

PERIODO DE VALIDEZ: 02 (dos) años después de la fecha de fabricación. Después de la primera perforación de la tapa el producto puede ser utilizado por hasta 60 días.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Bimeda Brasil S.A.
INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Reg. San. N°:
Guatemala BR467-14-02-15493
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica MV-7496
Panama





PERIODO DE VALIDEZ: 02 (dos) años
después de la fecha de fabricación.
Después de la primera perforación de la
tapa el producto puede ser utilizado por
hasta 60 días.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:
Bimeda Brasil S.A.
INDUSTRIA BRASILENA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Reg. San. N°:
Guatemala BR467-14-02-15493
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica MV-7496
Panamá

 **Bimeda**[®]

dolvet[®]

SOLUCIÓN INYECTABLE

**PIROXICAM 20 mg / mL
USO VETERINARIO**

**ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO**



Contenido 250mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Piroxicam 20 mg
Excipientes c.s.p.


INDICACIONES
Afecciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético tales
como artritis, bursitis, tenositis osteoartritis. Traumatismos agudos y
crónicos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Inyectar vía intramuscular profunda.
CANINOS Y FELINOS: 0.3 mg/Kg 1 vez al día. Dosis de impacto de 0.6
mg/Kg de peso (1 c.c./33 Kg) el primer día y continuar con 0.3 mg/Kg (0.5
c.c./ 33 Kg) por 3 a 5 días.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES: La administración del
medicamento deberá ser estrechamente supervisada en pacientes con
historia de enfermedad gastrointestinal alta.
Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar. Mantener
fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lea el inserto antes de
utilizar el producto.

Lea el inserto antes de utilizar el producto.

LOTE:
FABRICACION:
VENCIMIENTO:



dolvet[®]

USO VETERINARIO (PIROXICAM 20 mg/mL)

SOLUCIÓN INYECTABLE ANTIINFLAMATORIO-ANALGÉSICO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Piroxicam..... 20.00 mg
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES:

Afecciones agudas y crónicas del sistema músculo esquelético tales como: Artritis, Bursitis, Tendinitis, Osteoartritis, Traumatismos agudos y Cirugías

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Injectar vía intramuscular profunda. **CANINOS Y FELINOS:** 0.3 mg/Kg 1 vez al día. Dosis de impacto de 0.6 mg/Kg de peso (1 c.c./33 Kg) el primer día y continuar con 0.3 mg/Kg (0.5 c.c./ 33 Kg) por 3 a 5 días.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

El piroxicam está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga, en pacientes en quienes la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides inducen los síntomas de asma, rinitis, angioedema o urticaria. El uso concomitante de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides potencializan la existencia de sensibilidad.

PRECAUCIONES:

Se ha recomendado una incidencia infrecuente de ulceración péptica y hemorragia gastrointestinal, en raros casos fatales, con el uso de piroxicam. La administración del medicamento deberá ser estrechamente supervisada en pacientes con historia de enfermedad gastrointestinal alta. Los antiinflamatorios no esteroides inhiben la síntesis de prostaglandina renal que juega un rol de soporte en el mantenimiento de la perfusión renal en pacientes cuyo flujo sanguíneo renal y volumen sanguíneo ha disminuido. Debido a la extensa excreción renal de piroxicam y su producto de biotransformación (menos del 5% de la dosis diaria se excreta sin cambio), se deben considerar dosis menores de piroxicam en paciente con función renal deterioradas y deben ser cuidadosamente monitorizados. Los antiinflamatorios no esteroides pueden causar retención de sodio, potasio y líquidos y pueden interferir con la acción de los agentes diuréticos. Estas propiedades deben tenerse en cuenta cuando se trate a pacientes con compromiso de la función cardíaca o hipertensión, ya que estas pueden ser responsables del empeoramiento de dichas condiciones. Al igual que otros antiinflamatorios no esteroides el uso concomitante de piroxicam con ácido acetilsalicílico o con otro antiinflamatorio no esteroide no es recomendable, pues no se han establecido hasta el momento que estas combinaciones produzcan efectos superiores a los logrados con una sola droga, mientras que el riesgo de reacciones adversas aumenta. El piroxicam está altamente ligado a proteínas y por lo tanto puede esperarse que desplace a otras drogas ligadas a proteínas

REACCIONES ADVERSAS:

El piroxicam es generalmente bien tolerado. Los efectos colaterales más comúnmente encontrados son los síntomas gastrointestinales, pero en muchas circunstancias no interfieren en el curso del tratamiento. Estas reacciones adversas incluyen estomatitis, anorexia, malestar epigástrico, náuseas, constipación, molestias abdominales, flatulencia, diarrea, dolor abdominal e indigestión. Evaluaciones objetivas del estado de la mucosa gástrica y de la pérdida sanguínea intestinal, muestran que 20mg/día de piroxicam administrados ya sea en una sola dosis o dividida, es significativamente menos irritante para el tracto gastrointestinal que el ácido acetilsalicílico. La administración a largo plazo de 30 mg/día o más, aumenta el riesgo de efectos colaterales gastrointestinales. Se han reportado ojos hinchados, visión borrosa e irritación ocular. Se han observado cambios en diferentes parámetros de la función hepática. Tal como ocurre con otros antiinflamatorios no esteroides, algunos pacientes presentan incrementos en los niveles de transaminasas séricas durante el tratamiento con piroxicam.

TRATAMIENTO A DOSIS EXCESIVAS:

Hay información limitada a cerca de intoxicación por piroxicam, pero se conoce que los perros pueden ser más sensitivos a los efectos ulcerativos que los humanos. En casos de sobredosis con piroxicam se recomienda tratamiento sintomático de mantenimiento. Estudios preliminares indican que la administración de carbón activado reduce la reabsorción de piroxicam, así como la cantidad de droga activa disponible.

Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE VALIDEZ: 02 (dos) años después de la fecha de fabricación. Después de la primera perforación de la tapa el producto puede ser utilizado por hasta 60 días.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y ADMINISTRAR BAJO SUPERVISIÓN MÉDICO VETERINARIO.

FABRICANTE:

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421 Monte Mor/SP -
CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A. Boulevard Los Próceres 24-69
Zona Pradera Torre II Niv.15 Of.1512
Guatemala

Reg. San. N°:

Guatemala BR467-14-02-15493
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica MV-7496
Panamá

INDUSTRIA BRASILEÑA

