

FÓRMULA: Cada 1 mL de solución oftálmica contiene:

Latanoprost 0.05 mg
Vehículo c.s.p. 1 mL

DOSIS: Ver prospecto adjunto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.
Producto Medicinal Veterinario.
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Almacenar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y el calor.
Conservar a una temperatura menor a 30°C. Venta con receta médica.

Cont. net.
2.5 mL

OPHTAL DROP

LATANDROP

Latanoprost 0.005%

Solución oftálmica

estéril

**USO
VETERINARIO**



LOTE:

VENCE:



Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELLCO CORPORATION, S.A.
www.wellcopharma.com

Handwritten signature

WELLCO

Latanoprost 0.005%

**OPHTAL DROP
LATANDROP**



VET

Contenido neto 2.5mL

**OPHTAL DROP
LATANDROP**

Latanoprost 0.005%

**SOLUCIÓN OFTÁLMICA
ESTÉRIL**

FORMULA:
Cada 1 mL de solución oftálmica
contiene:
Latanoprost 0.05 mg
Vehículo csp 1 mL

REGISTROS SANITARIOS:
Guatemala: GT19-40-12-12669
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua:
Costa Rica: MV-7763

**LOTE:
FAB:
VENCE:**



Producto elaborado en
Guatemala por
WELLCO CORPORATION, S.A.
www.wellcopharma.com
Tel: (502) 6628 - 1900

En El Salvador importado y
distribuido por
Representaciones RAM
Tel.: (503) 22848356

Contenido neto 2.5 mL

**OPHTAL DROP
LATANDROP**

Latanoprost 0.005%

CLASE FARMACOLÓGICA:
Antiglaucomatoso

ESPECIES DE DESTINO:
Caninos y felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oftálmica.

INDICACIÓN: reducción de la presión
intraocular elevada en perros y gatos
con glaucoma de ángulo abierto e
hipertensión ocular.

DOSIS: administrar 1 gota cada 12
horas o según indique el médico
veterinario.

**CONTRAINDICACIONES,
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIO-
NES:** contraindicado en pacientes con
hipersensibilidad a los componentes.
Evite el contacto con la punta del
gotero con cualquier superficie,
incluyendo el ojo.

Producto medicinal veterinario.
Conservar fuera del alcance
de los niños y animales domésticos.
Almacenar en un lugar fresco y seco,
protegido de la luz y el calor.
Conservar a una temperatura menor a
30 °C.

Se recomienda desechar el contenido
un mes después de abierto. Mantenga
el frasco cerrado. Para no contaminar
el contenido evite el contacto de la
punta del gotero con cualquier
superficie, incluyendo el ojo.

Venta con receta médica.

Lea el prospecto adjunto antes de
utilizar el producto.



Solución oftálmica
estéril
**USO
VETERINARIO**



Solución oftálmica
estéril
**USO
VETERINARIO**



7 404000 316636



FÓRMULA: Cada 1 mL de solución oftálmica contiene:

Latanoprost 0.05 mg

Vehículo c.s.p. 1 mL

DOSIS: Ver prospecto adjunto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.

Producto Medicinal Veterinario.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C. Venta con receta médica.

Cont. net.
5 mL

OPHTAL DROP

LATANDROP

Latanoprost 0.005%

Solución oftálmica

estéril

USO

VETERINARIO



7 404000 316636

LOTE:

VENCE:



Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELCO CORPORATION, S.A.
www.welcopharma.com



Latanoprost 0.005%
LATANDROP
OPHTAL DROP



VET

Contenido neto 5mL

OPHTAL DROP
LATANDROP

Latanoprost 0.005%



Solución oftálmica
estéril
**USO
VETERINARIO**

**SOLUCIÓN OFTÁLMICA
ESTÉRIL**

FORMULA:
Cada 1 mL de solución oftálmica
contiene:
Latanoprost 0.05 mg
Vehículo csp 1 mL

REGISTROS SANITARIOS:
Guatemala: GT 19-40-12-12669
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua:
Costa Rica: MV-7763

LOTE:
FAB:
UENCE:



Producto elaborado en
Guatemala por
WELLCO CORPORATION, S.A.
www.wellcopharma.com
Tel: (502) 6628 - 1900

En El Salvador importado y
distribuido por
Representaciones RAM
Tel.: (503) 22848356

Contenido neto 5 mL

OPHTAL DROP
LATANDROP

Latanoprost 0.005%



Solución oftálmica
estéril
**USO
VETERINARIO**

CLASE FARMACOLÓGICA:
Antiglaucomatoso

ESPECIES DE DESTINO:
Caninos y felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oftálmica.

INDICACIÓN: reducción de la presión
intraocular elevada en perros y gatos
con glaucoma de ángulo abierto e
hipertensión ocular.

DOSIS: administrar 1 gota cada 12
horas o según indique el médico
veterinario.


**CONTRAINDICACIONES,
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIO-
NES:** contraindicado en pacientes con
hipersensibilidad a los componentes.
Evite el contacto con la punta del
gotero con cualquier superficie,
incluyendo el ojo.

Producto medicinal veterinario.
Conservar fuera del alcance
de los niños y animales domésticos.
Almacenar en un lugar fresco y seco,
protegido de la luz y el calor.
Conservar a una temperatura menor a
30 °C.

Se recomienda desechar el contenido
un mes después de abierto. Mantenga
el frasco cerrado. Para no contaminar
el contenido evite el contacto de la
punta del gotero con cualquier
superficie, incluyendo el ojo.

Venta con receta médica.

Lea el prospecto adjunto antes de
utilizar el producto.



7 404000 316636



LATANDROP

Solución oftálmica estéril
Latanoprost 0.005%

FÓRMULA:

Cada 1 mL de solución oftálmica contiene:

Latanoprost 0.05 mg

Vehículo csp 1 mL

CLASE FARMACOLÓGICA:

Antiglaucomatoso.

ESPECIES DE DESTINO:

Caninos y felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.

INDICACIONES:

Reducción de la presión intraocular elevada en perros y gatos con glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes. En los estudios en monos las dosis clínicas de latanoprost tuvieron efectos mínimos o nulos sobre la circulación sanguínea intraocular. Sin embargo, durante el tratamiento tópico se puede producir una hiperemia conjuntival o episcleral de leve a moderada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Se recomienda desechar el contenido un mes después de abierto. Para no contaminar el contenido evite el contacto de la punta del gotero con cualquier superficie, incluyendo el ojo. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. Producto exclusivo en medicina veterinaria.

DOSIS:

Se debe administrar 1 gota cada 12 horas o según indique el médico veterinario.

FARMACOCINÉTICA:

Latanoprost es un profármaco en forma de éster isopropílico, inactivo por sí mismo, pero que después de su hidrólisis al ácido de latanoprost se transforma en una molécula activa biológicamente. El profármaco se absorbe bien a través de la córnea y todo el fármaco que llega al humor acuoso se hidroliza durante su paso a través de la córnea. Después de la administración tópica a monos, el latanoprost se distribuye fundamentalmente por el segmento anterior, la conjuntiva y los párpados. Al segmento posterior sólo llegan cantidades mínimas del fármaco. En el ojo no se produce prácticamente ningún metabolismo del

ácido de latanoprost. El metabolismo principal tiene lugar en el hígado. La semivida plasmática es de 17 minutos. En los estudios en animales los principales metabolitos, 1,2-dinor y 1,2,3,4-tetranor, ejercen una actividad biológica nula o débil, y su excreción tiene lugar fundamentalmente en orina.

FARMACODINAMIA DEL PRODUCTO:

El principio activo latanoprost, un análogo de la prostaglandina F_{2α}, es un agonista selectivo del receptor prostanoide FP, que reduce la presión intraocular aumentando el drenaje del humor acuoso. La reducción de la presión intraocular comienza alrededor de las tres o cuatro horas después de la administración y el efecto máximo se alcanza entre las ocho y las doce horas. La disminución de la presión se mantiene durante al menos 24 horas. Los estudios en humanos y en animales indican que el principal mecanismo de acción consiste en un aumento del drenaje uveoescleral.

PRESENTACIONES: 2.5 mL y 5 mL

Producto exclusivo en medicina veterinaria.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Almacenar en un lugar fresco y seco,
protegido de la luz y el calor.
Conservar a una temperatura menor a 30 °C.

Venta con receta médica.

Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELCO CORPORATION, S.A.
www.welcopharma.com

